Инструкция по применению
Биотиналь B7 Таблетки 10 мг 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Польфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Биотин
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 36



Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета с гравировкой «10» на одной стороне.

Действующее вещество

Биотин

Состав

Препарат Биотиналь B7 содержит: Действующим веществом является биотин (D-биотин). Каждая таблетка содержит 10,0 мг биотина (D-биотина). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, микрокристаллическая целлюлоза, повидон, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Биотиналь В7 применяется для лечения дефицита биотина, в том числе таких симптомов как выпадение волос, нарушение роста волос и ногтей, включая дегенеративные нарушения структуры волос (сухость, ломкость), после исключения прочих причин у взрослых в возрасте старше 18 лет. Препарат Биотиналь В7 применяется для лечения диффузной алопеции (патологическое полное или частичное выпадение, или поредение волос) не гормональной этиологии, снижения густоты и интенсивности выпадения волос у взрослых в возрасте старше 18 лет.

Противопоказания

Не принимайте препарат Биотиналь В7: * если у Вас аллергия на биотин (D-биотин) или на любые другие компоненты препарата; * если Вы беременны или кормите ребенка грудью; * если у Вас выявлены непереносимость лактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Не принимайте препарат во время беременности. Количество биотина, содержащееся в препарате Биотиналь В7, значительно превышает рекомендованную суточную норму для беременных женщин. Не проводилось исследований влияния применения биотина в высоких дозах во время беременности. Грудное вскармливание Не принимайте препарат во время грудного вскармливания. Количество биотина, содержащегося в препарате Биотиналь В7, значительно превышает рекомендуемую суточную норму для кормящих женщин. Биотин проникает в материнское молоко, однако не было обнаружено какого-либо влияния на грудного ребенка.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Биотиналь В7 больше, чем следовало Если Вы приняли препарата больше, чем следовало, сообщите об этом врачу. О передозировке или отравлении биотином не сообщалось.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.