Инструкция по применению
Биотиналь B7 Таблетки 10 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Польфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Препарат Биотиналь B7 содержит действующее вещество биотин (D-биотин), относящееся к группе витаминных препаратов. Биотин является водорастворимым витамином, относящимся к витаминам группы B. Биотин входит в состав четырех ферментов, которые играют важную роль в метаболизме глюкозы, липидов, некоторых аминокислот, а также участвует в энергетическом обмене.

Состав

Препарат Биотиналь B7 содержит: Действующим веществом является биотин (D-биотин). Каждая таблетка содержит 10,0 мг биотина (D-биотина). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактозы моногидрат, микрокристаллическая целлюлоза, повидон, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Биотиналь В7 применяется для лечения дефицита биотина, в том числе таких симптомов как выпадение волос, нарушение роста волос и ногтей, включая дегенеративные нарушения структуры волос (сухость, ломкость), после исключения прочих причин у взрослых в возрасте старше 18 лет. Препарат Биотиналь В7 применяется для лечения диффузной алопеции (патологическое полное или частичное выпадение, или поредение волос) не гормональной этиологии, снижения густоты и интенсивности выпадения волос у взрослых в возрасте старше 18 лет.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.   Рекомендуемая доза 1 таблетка 1 раз в сутки.   Путь и (или) способ введения Препарат следует принимать внутрь, таблетку следует запивать достаточным количеством воды (например, ½ стакана).   Продолжительность терапии Продолжительность курса лечения не должна превышать 90 дней. Облегчение симптомов наблюдается примерно через 4 недели применения. При необходимости курс лечения можно повторить.   Если Вы забыли принять препарат Биотиналь В7 Если Вы пропустите прием дозы, примите ее, как только Вы об этом вспомните. Если Вы об этом не вспомните до времени приема Вашей следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу и вернитесь к Вашему обычному графику приема. Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную.   Если Вы прекратили прием препарата Биотиналь В7 Продолжайте принимать этот препарат так долго, сколько назначит Ваш врач. Вы не должны прекращать прием этого препарата, не проконсультировавшись предварительно со своим врачом.

Противопоказания

Не принимайте препарат Биотиналь В7: если у Вас аллергия на биотин (D-биотин) или на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша); если Вы беременны или кормите ребенка грудью; если у Вас выявлены непереносимость лактозы, дефицит лактазы или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Не принимайте препарат во время беременности. Количество биотина, содержащееся в препарате Биотиналь В7, значительно превышает рекомендованную суточную норму для беременных женщин. Не проводилось исследований влияния применения биотина в высоких дозах во время беременности. Грудное вскармливание Не принимайте препарат во время грудного вскармливания. Количество биотина, содержащегося в препарате Биотиналь В7, значительно превышает рекомендуемую суточную норму для кормящих женщин. Биотин проникает в материнское молоко, однако не было обнаружено какого-либо влияния на грудного ребенка.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Препарат может вызывать указанные ниже нежелательные реакции: Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): головная боль; частый, жидкий стул (диарея), повышенное газообразование в кишечнике (метеоризм); зуд волосистой части головы, зуд кожи; боль в поясничной области, боль в молочных железах; повышение температуры тела. Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): крапивница (аллергические реакции); желудочно-кишечные расстройства.

Передозировка

Если Вы приняли препарата больше, чем следовало, сообщите об этом врачу. О передозировке или отравлении биотином не сообщалось

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. противосудорожные препараты (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, примидон) вызывают снижение уровня биотина в крови. вальпроевая кислота (препарат для лечения эпилепсии, биполярного расстройства и мигрени) снижает активность биотинидазы (фермента, участвующего в обмене биотина). алкоголь снижает уровень биотина в крови. стероидные гормоны могут ускорить катаболизм (процесс распада) биотина в тканях. антибиотики могут снижать концентрацию или активность биотина, нарушая функцию микрофлоры кишечника. авидин, щелочной гликопротеин, содержащийся в яичном белке, обладает способностью связываться с биотином, инактивировать (устранять) его и предотвращать его всасывание. В случае дефицита биотина или его применения не следует употреблять в пищу сырой куриный яичный белок. курение сигарет ускоряет катаболизм биотина, что может привести к его дефициту и снижению эффективности лечения.

Особые указания

Дети и подростки Не давайте препарат Биотиналь В7 детям в возрасте до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность не установлены.   Препарат Биотиналь В7 с пищей и алкоголем Во время применения препарата не следует употреблять в пищу сырой куриный яичный белок, поскольку это может привести к угнетению всасывания биотина. Алкоголь снижает уровень биотина в крови.   Управление транспортными средствами и работа с механизмами Свойства биотина и тип наблюдаемых нежелательных реакций указывают на то, что препарат не оказывает отрицательного влияния на управление транспортными средствами и работы с механизмами.   Препарат Биотиналь В7 содержит лактозы моногидрат и натрий Препарат содержит лактозы моногидрат. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного препарата. Данный препарат содержит менее 1 ммоль натрия в разовой дозе препарата, то есть, по сути, не содержит натрия.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.   Не применяйте этот препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.   Хранить при температуре не выше 25 ° С.   Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.