Инструкция по применению
Биотредин Таблетки подъязычные 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Биотики
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиридоксин+Треонин
Количество в упаковке: 30



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или кремового цвета с фаской.

Действующее вещество

Пиридоксин+Треонин

Состав

Действующие вещества: треонин – 100 мг, пиридоксина гидрохлорид – 5 мг; вспомогательные вещества: повидон (K17) – 3,51 мг, лимонной кислоты моногидрат – 0,59 мг, лактозы моногидрат – 6,73 мг, магния стеарат – 1,17 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Треонин и пиридоксин полностью метаболизируются до конечных продук- тов. Их накопления в организме не происходит.

Показания

Назначают детям, подросткам и взрослым при снижении умствен- ной работоспособности и концентрации внимания. Препарат назначают лицам, злоупотребляющим алкоголем, больным хроническим алкоголизмом при актуализации патологического влечения к алкоголю, сочетающегося с аффективными (раздражительность, сниженное настроение, внутренний дискомфорт), сенсорными (чувство голода) и идеаторными (мысли об алкоголе) нарушениями, при алкогольном абстинентном синдроме, а также для поддержания ремиссий.

Способ применения и дозы

Препарат назначают в таблетках под язык или в виде порошка после измельчения таблетки. Наибольший эффект Биотредина® достигается при его сочетании с препаратом Глицин. 1 таблетку (100 мг) Глицина принимают под язык за 10–15 минут до приема Биотредина®. В качестве средства, повышающего внимание, умственную работоспособность: детям, подрост- кам и взрослым по 1 таблетке 2–3 раза в день в течение 3–10 дней. При необходимости курс повторяют 3–4 раза и более в год. Лечение алкогольного абстинентного синдрома: в первые сутки 1–4 таблетки 3–4 раза в день (суточная доза 3–16 таблеток), во вторые сутки и далее по 1–2 таблетки на прием 2–3 раза в день (суточная доза 3–6 таблеток) в течение 21–28 дней. Курс можно сократить до 10–14 дней. Больным хроническим алкоголизмом и злоупотребляющим алкоголем: по 1–3 таблетки на прием 2–3 раза в день в течение 4–5 дней. При необходимости курсы повторяют 5–10 раз в год. В период ремиссии для выявления скрытого влечения к алкоголю: 2–3 таблетки Биотредина® принимают натощак. Появление в течение 10–20 минут легкого головокружения, успокаивающе- го эффекта, покраснения лица, потоотделения свидетельствует о наличии « скрытой тяги». В этих случаях рекомендуется 5–10 дневный курс Биотредина® вместе с Глицином: по 1–2 таблетки 2–3 раза в день. Глицин принимается по 1 таблетке (100 мг) под язык за 10–15 минут до приема Биотредина®.

Противопоказания

Алкогольное опьянение, одновременный прием лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (анксиолитиков, антипсихотических средств (нейролептиков), антидепрессантов и пр.), повышенная чувствительность к витамину B6. Не рекомендуется применять при врожденной галактоземии, синдроме мальабсорбции глюкозы и при врожденной лактазной недостаточности, т.к. в состав препарата входит лактоза.

Применение при беременности и кормлении грудью

Отдельных исследова- ний не проводилось. Не рекомендуется использовать при беременности и в период грудного вскармливания. При злоупотреблении алкоголем и алкоголизме препарат может применяться при беременности и во время грудного вскармливания, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Побочные действия

Головокружение, повышенное потоотделение, аллергические реакции при непереносимости витамина B6.

Передозировка

Случаев передозировки не выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с антипсихотически- ми лекарственными средствами, антидепрессантами, анксиолитиками, барбитуратами. Ослабля- ет действие антипсихотических средств (нейролептиков), антидепрессантов, барбитуратов и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Особые указания

Не рекомендуется применять в период опьянения, т.к. снижается лечебный эффект препарата. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы либо при врожденной лактазной недостаточности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.