Инструкция по применению
Бисакодил-Альтфарма Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Альтфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бисакодил
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Действующее вещество

Бисакодил

Состав

1 супп. содержит:Активное вещество: бисакодил 10 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Бисакодил не абсорбируется из ЖКТ. Является пролекарством, в щелочной среде происходит гидролиз с образованием вещества, оказывающего раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ.

Показания

Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в частности, у пожилых пациентов; запоры после операций, родов). Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах. Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым - по 5-15 мг, детям в возрасте 8-14 лет - по 10 мг, 2-8 лет - по 5 мг. Частота приема 1 раз на ночь или утром за 30 мин до еды. Ректально взрослым - 10-20 мг; детям в возрасте 8-14 лет - по 10 мг, 2-7 лет - по 5 мг.

Противопоказания

Кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, боли в животе неясного генеза, перитонит, кровотечения из ЖКТ, маточные кровотечения, цистит, спастический запор, острый проктит, острый геморрой.

Применение при беременности и кормлении грудью

Бисакодил применяют с осторожностью при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны системы пищеварения: возможны коликообразные боли в области кишечника, диарея (может привести к чрезмерным потерям жидкости и электролитов и, следовательно, развитию мышечной слабости, судорог, артериальной гипотензии).

Передозировка

Симптомы: диарея с потерей большого количества жидкости и электролитов (мышечная слабость, судороги, нарушение сердечной деятельности, артериальная гипотензия). Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении возможно уменьшение концентрации дигоксина в плазме крови.

Особые указания

С осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени и почек. Не применять в течение длительного времени. Не рекомендуется принимать одновременно с молоком и щелочной минеральной водой.