Инструкция по применению
Бисакодил суппозитории ректальные 10 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бисакодил
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Описание

Суппозитории от белого до белого со слегка желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы.

Действующее вещество

Бисакодил

Состав

На 1 суппозиторий:Действующее вещество: бисакодил - 10,0 мг,Вспомогательные вещества: жир твердый (витепсол (марки H 15, W 35). суппосир (марки NA 15, NAS 50)) - до получения суппозитория массой 1,25 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Гипотонические и атонические запоры (в т.ч. запоры у пожилых, запоры после операций и родов). Регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего прохода). Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Способ применения и дозы

Препарат применяют ректально в следующих дозах: взрослым и детям старше 14 лет - 10- 20 мг бисакодила (1-2 суппозитория), детям 8-14 лет - 10 мг бисакодила (1 суппозиторий).

Противопоказания

Гиперчувствительность. кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия, цистит, спастические запоры, острый проктит, детский возраст до 8 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью возможно применение в период беременности и лактации.

Побочные действия

Кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного обмена, мышечная слабость, судороги, снижение артериального давления), боль в животе, метеоризм, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Не применять в течение длительного времени.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.