Инструкция по применению
Бисопролол-АЛСИ Таблетки 5 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алси Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бисопролол
Количество в упаковке: 1



Описание

Бисопролол-АЛСИ, 5 мг, таблетки Круглые таблетки белого или почти белого цвета двояковыпуклой формы с риской с одной стороны.

Действующее вещество

Бисопролол

Состав

Препарат Бисопролол-АЛСИ содержит Действующим веществом является бисопролол. Бисопролол-АЛСИ, 5 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 5 мг бисопролола (в виде фумарата). Прочими ингредиентами являются: целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), целлюлоза микрокристаллическая (тип 101), кросповидон, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Бисопролол-АЛСИ применяется для лечения у взрослых в возрасте от 18 лет при: Артериальной гипертензии, Ишемической болезни сердца: стабильной стенокардии, Хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. Рекомендуемая доза Артериальная гипертензия и стабильная стенокардия Во всех случаях режим приёма и дозу Вам индивидуально подберёт врач. Обычно начальная доза составляет 5 мг бисопролола 1 раз в сутки. При необходимости дозу можно увеличить до 10 мг 1 раз в сутки. Максимальная рекомендованная доза препарата Бисопролол-АЛСИ составляет 20 мг 1 раз в сутки. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) Лечение препаратом Бисопролол-АЛСИ проводится в соответствии со схемой, назначенной Вам лечащим врачом. Рекомендуемая начальная доза составляет 1,25 мг 1 раз в сутки. В зависимости от индивидуальной переносимости, Ваш лечащий врач может постепенно увеличить дозу до 2,5 мг, 3,75 мг, 5 мг, 7,5 мг и 10 мг один 1 в сутки. Каждое последующее увеличение дозы бисопролола должно осуществляться не ранее, чем через 2 недели. В случае назначения препарата в дозе 1,25 мг и 3,75 мг следует применять лекарственные препараты бисопролола в дозе 2,5 мг, с риской, других производителей. В случае назначения препарата в дозе 2,5 мг, 5 мг и 10 мг следует применять лекарственный препарат Бисопролол-АЛСИ в соответствующей дозировке. Максимальная рекомендованная доза бисопролола составляет 10 мг 1 раз в сутки. Путь и (или) способ введения Принимайте препарат Бисопролол-АЛСИ 1 раз в сутки, утром, с небольшим количеством жидкости, независимо от времени приёма пищи. Таблетки не следует разжёвывать или растирать в порошок. Продолжительность терапии Принимайте препарат ежедневно, без перерыва, как Вам назначил лечащий врач. Продолжительность лечения препаратом для Вас определит лечащий врач.

Противопоказания

Не принимайте препарат Бисопролол-АЛСИ: Если у Вас аллергия на бисопролол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), Если у Вас острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии обострения, требующая проведения другой терапии, Если у Вас острое серьёзное заболевание сердца, сопровождающееся низким артериальным давлением и нарушением кровообращения (кардиогенный шок), Если у Вас нарушение проведения электрического импульса из предсердий в желудочки (атриовентрикулярная (AV) блокада II и III степени, без электрокардиостимулятора), Если у Вас нарушение проведения импульса в области синусового узла, что приводит к аритмиям и возможной остановке сердца (синдром слабости синусового узла), Если у Вас нарушение проведения импульса в области синусового узла (синоатриальная блокада), Если у Вас выраженное снижение сердечного ритма (брадикардия) (число сердечных сокращений (ЧСС) менее 60 ударов в минуту) до начала терапии, Если у Вас низкое артериальное давление (выраженная артериальная гипотензия, артериальное давление (АД) менее 100 мм рт.ст.), Если у Вас тяжёлые формы бронхиальной астмы, Если у Вас серьёзные нарушения кровообращения в конечностях (например, синдром Рейно), которые могут вызвать дискомфорт и покалывание пальцев рук и ног, которые сопровождаются изменением цвета кожи от бледного до синего, Если у Вас опухоль надпочечников, которая выделяет гормоны, повышающие артериальное давление (феохромоцитома), Если у Вас кислотно-щелочное расстройство, приводящее к угрожающим жизни состояниям (метаболический ацидоз).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приёма препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Бисопролол может оказать неблагоприятное воздействие на течение беременности и организм плода /новорождённого. Снижая кровоток в плаценте, может приводить к задержке роста плода, внутриутробной гибели плода или преждевременным родам. При беременности бисопролол следует принимать только в случае абсолютной необходимости по назначению врача. Грудное вскармливание Бисопролол не рекомендуется женщинам в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Бисопролол-АЛСИ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При

возникновении следующих серьёзных нежелательных реакций прекратите приём препарата и немедленно обратитесь к врачу: Очень часто (могут возникать у более чем у 1 человека из 10): уменьшение частоты сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту (брадикардия). Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): ощущение похолодания или чувство онемения в конечностях, особенно у пациентов с ХСН, выраженное снижение артериального давления, особенно у пациентов с ХСН, одышка, слабость, повышенная утомляемость, сердцебиение, отеки (усугубление симптомов течения ХСН у пациентов с ХСН). Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): нарушение проведения электрического импульса из предсердий в желудочки (AV проводимости), усугубление симптомов течения ХСН у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией, внезапное снижение артериального давления вследствие изменения положения тела (ортостатическая гипотензия), затруднение вдоха, ощущение недостатка воздуха, кашель (бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой или обструкцией дыхательных путей в прошлом), судороги мышц. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): потеря сознания, ощущение тяжести в правом подреберье, зуд кожи, жёлтый цвет кожи и слизистых (гепатит), отёк губ, языка, лица и шеи (ангионевротический отёк). Сообщите лечащему врачу, если заметите любую из следующих нежелательных реакций: Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): головокружение, головная боль, усугубление симптомов течения ХСН (у пациентов с ХСН), тошнота, рвота, понос (диарея), запор, ощущение усталости (астения) у пациентов с ХСН, повышенная утомляемость. Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): изменение настроения (депрессия), бессонница, мышечная слабость, астения у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): ложные либо искажённые образы и явления (галлюцинации), ночные кошмары, уменьшение слезоотделения (следует учитывать при ношении контактных линз), нарушения слуха, насморк, чихание, зуд в носу, слезотечение, заложенность носа, потеря обоняния (аллергический ринит), зуд и покраснение кожи, сыпь на коже (реакции повышенной чувствительности), импотенция (эректильная дисфункция), повышение в крови концентрации триглицеридов, аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ). Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит), выпадение волос (алопеция), появление высыпаний с чешуйчатым шелушением на поверхности (псориаз, псориазоподобная сыпь). Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-

членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Бисопролол-АЛСИ больше чем следовало Если Вы приняли препарата Бисопролол-АЛСИ больше, чем следовало, у Вас могут возникнуть следующие симптомы: нарушение сердечного ритма, снижение ЧСС, снижение АД, затруднение дыхания, нарушение сердечной деятельности, вплоть до остановки сердца, снижение уровня глюкозы в крови. Прекратите приём препарата и немедленно обратитесь к врачу или в ближайший пункт скорой помощи, если у Вас возникли перечисленные выше симптомы. Если Вы забыли принять препарат Бисопролол-АЛСИ Если Вы забыли принять препарат, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Обязательно поставьте в известность лечащего врача, если Вы принимаете следующие препараты, так как при их приёме следует соблюдать осторожность: антиаритмические средства I класса (например, хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон), блокаторы «медленных» кальциевых каналов (например, верапамил, фелодипин, амлодипин, дилтиазем), гипотензивные средства (средства для снижения давления) центрального действия (такие как клонидин, метилдопа, моксонидин, рилменидин), финголимод (препарат для лечения рассеянного склероза), антиаритмические средства III класса (например, амиодарон), бета-адреноблокаторы для местного применения (например, глазные капли для лечения глаукомы), парасимпатомиметики (например, ацетилхолин), гипогликемические лекарственные средства (например, глимепирид, метформин, ситаглиптин), средства для проведения общей анестезии, сердечные гликозиды (дигоксин), нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, мелоксикам, нимесулид), симпатомиметики (изопреналин, добутамин, норэпинефрин, эпинефрин), препараты, снижающие артериальное давление (трициклические антидепрессанты, барбитураты, фенотиазины), мефлохин (препарат для лечения малярии), ингибиторы моноаминоксид азы (МАО) (за исключением ингибиторов МАО В), алкалоиды спорыньи (например, эрготамин), рифампицин (антибактериальный препарат).

Особые указания

Хирургические вмешательства и общая анестезия При необходимости проведения хирургических вмешательств следует предупредить врача-анестезиолога о том, что Вы принимаете препарат Бисопролол-АЛСИ. Контактные линзы При приёме препарата Бисопролол-АЛСИ и одновременном использовании контактных линз, возможно снижение продукции слёзной жидкости глаза (уменьшение слезоотделения). Прекращение или отмена терапии Не следует резко прерывать лечение бисопрололом или менять рекомендованную дозу без предварительной консультации с врачом, так как это может привести к временному ухудшению работы сердца. Лечение не следует прерывать внезапно, особенно если у Вас установлен диагноз — ишемическая болезнь сердца (ИБС). Если необходимо прекратить лечение, то принимаемую дозу бисопролола следует снижать постепенно. В случае значительного утяжеления состояния следует временно возобновить приём бисопролола. Дети и подростки Не давайте препарат детям от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность не установлены. Данные отсутствуют. Бисопролол не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Однако, вследствие индивидуальных реакций, способность управлять автотранспортом или работать с технически сложными механизмами может быть нарушена. На это следует обратить особое внимание в начале лечения, после изменения дозы, а также при одновременном употреблении алкоголя.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребёнок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке).