Инструкция по применению
Бом-Бенге Мазь для наружного применения 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метилсалицилат+Рацементол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 20.2 г+3.9 г/100 г
Срок годности: 5



Описание

Средства для местного применения при болях в суставах и мышцах. Лекарственные средства, содержащие производные салициловой кислоты.

Действующее вещество

Метилсалицилат+Рацементол

Состав

Состав на 100 г. Действующие вещества левоментол - 3,9 г, метилсалицилат -20,2 г. Вспомогательные вещества вазелин - 68,9 г, парафин (парафинов нефтяных твердых) - 7,0 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении активные компоненты препарата не абсорбируются в системный кровоток и не оказывают системного действия.

Показания

Для временного облегчения болей в суставах и мышцах (растяжения связок, ушибы), болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника (люмбаго, ишиас).

Способ применения и дозы

Наружно (в виде растираний).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата, открытые раны, раздражение кожи, дети до 6 лет. С осторожностью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан в III триместре беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Применяется в I-II триместрах беременности только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Побочные действия

Местные реакции аллергические реакции (зуд, крапивница, кожная сыпь).

Передозировка

Передозировка ментола и метилсалицилата наблюдалась в отдельных случаях, главным образом у детей при случайном приеме внутрь препаратов, содержащих данные вещества. Симптомы передозировки возбуждение, увеличение глубины! дыхания, гиперпирексия, тошнота, боль в животе, рвота и симптомы угнетения центральной нервной системы, такие как головокружение, неустойчивая походка, приливы крови к лицу, сонливость, угнетение дыхания и кома. Лечение симптоматическое и поддерживающее коррекция водно-электролитного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела в тяжелых случаях -переливание крови, гемодиализ. Передозировка при местном применении происходит редко и только при неправильном применении препарата (нанесение на слизистые оболочки, на обширные области поврежденной или инфицированной кожи).

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное средство вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани - совместное применение с другими лекарственными средствами локального действия может приводить к усилению их всасывания. Данное лекарственное средство в больших количествах может повышать токсичность метотрексата. Данное лекарственное средство в больших количествах может снижать терапевтический эффект гипогликемических средств.

Особые указания

Не допускать попадания на конъюнктиву и другие слизистые оболочки. Не наносить на поврежденную или раздраженную кожу. Не применять с согревающими компрессами. Не применять с пероральными антикоагулянтами.

Условия хранения

Защищенном от света месте, беречь от детей.