Инструкция по применению
Бом-Бенге Мазь 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метилсалицилат+Рацементол
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь от светло-желтого до желтого цвета, с запахом левоментола и метилсалицилата.

Действующее вещество

Метилсалицилат+Рацементол

Состав

На 100 г:Действующие вещества: левоментол - 3,9 г, метилсалицилат - 20,2 г. Вспомогательные вещества: вазелин - 68,9 г, парафин (парафинов нефтяных твердых) - 7,0 г

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении активные компоненты препарата не абсорбируются в системный кровоток и не оказывают системного действия.

Показания

Атралгии, миалгии, (мышечные боли) до и после занятий спортом, болевой синдром при заболеваниях околосуставных тканей, люмбоишиалгия, радикулит.

Способ применения и дозы

Наружно (в виде растираний).Необходимое количество мази (2-4 г, что соответствует объему крупной вишни), втирают в болезненные участки кожи. При необходимости процедуру повторяют через несколько часов (до 3 раз в день). Продолжительность курса (без консультации врача) 10 дней.Применение препарата при первом приеме или при его отмене: нет сведений.

Противопоказания

Гиперчувствительность, нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения.Беременность III триместр, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не применяется в период грудного вскармливания и в III триместре беременности. Применение I-II триместрах только, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Побочные действия

В редких случаях развивается гиперчувствительность к препарату, кожные аллергические реакции (зуд кожи, крапивница, кожная сыпь) а также ангионевротический отек.

Передозировка

Передозировка ментола и метилсалицилата наблюдалась в отдельных случаях, главным образом у детей при случайном приеме внутрь препаратов, содержащих данные вещества.Симптомы передозировки: возбуждение, увеличение глубины дыхания, гиперпирексия, тошнота, боль в животе, рвота и симптомы угнетения центральной нервной системы, такие как головокружение, неустойчивая походка, "приливы" крови к лицу, сонливость, угнетение дыхания и кома.Лечение симптоматическое и поддерживающее: коррекция водно-электролитного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела, в тяжелых случаях - переливание крови, гемодиализ.Передозировка при местном применении происходит редко и только при неправильном применении препарата (нанесение на слизистые оболочки, на обширные области поврежденной или инфицированной кожи).

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, таким образом, совместное применение с другими препаратами локального действия может приводить к усилению их всасывания.Использование больших количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект гипогликемических средств.Препарат не использовать с пероральными антикоагулянтами.

Особые указания

Не допускать попадания на конъюнктиву, другие слизистые оболочки.Не наносить на поврежденную или раздраженную кожу.Не применять с согревающими компрессами. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Нет сведений.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 15 °С.Хранить в недоступном для детей месте.