Инструкция по применению
Бом-Бенге Мазь для наружного применения 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метилсалицилат+Рацементол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 3 года

Действующее вещество

Метилсалицилат+Рацементол

Состав

активные вещества: ментол/масло мяты перечной 3,9/7,8 г; метилсалицилат 20,2 г; вспомогательные вещества: вазелин медицинский; парафины нефтяные твердые

Форма выпуска

Мазь

Показания

-артралгии-миалгии-болевой синдром при заболеваниях околосуставных тканей-люмбоишиалгия-радикулит

Способ применения и дозы

Наружно. Необходимое количество мази (2–4 г, что соответствует объему крупной вишни) втирают в болезненные участки кожи. При необходимости процедуру повторяют через несколько часов (до 3 раз в день). Продолжительность курса (без консультации врача) — до 10 дней.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому компоненту препаратаоткрытые раныраздражение кожидетский возраст до 6 летС осторожностью: беременность, грудное вскармливание, аспириновая бронхиальная астма, детский возраст от 6 до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью: беременность, грудное вскармливание, аспириновая бронхиальная астма, детский возраст от 6 до 12 лет.

Побочные действия

В редких случаях развивается гиперчувствительность к препарату, раздражение в месте введения, кожные аллергические реакции, а также ангионевротический отек.

Передозировка

Передозировка ментола и метилсалицилата наблюдалась в отдельных случаях, главным образом у детей, при случайном приеме внутрь препаратов, содержащих данные вещества.Симптомы: возбуждение, увеличение глубины дыхания, гиперпирексия, тошнота, боль в животе, рвота и симптомы угнетения ЦНС таких, как головокружение, неустойчивая походка, приливы к лицу, сонливость, угнетение дыхания и кома.Лечение: симптоматическое и поддерживающее; коррекция электролитного и водного баланса, назначение адсорбирующих средств и солевых слабительных, форсированный диурез, наружное охлаждение тела; в тяжелых случаях — переливание крови, гемодиализ.Передозировка мази Бом-Бенге при местном применении происходит редко и только при неправильном использовании препарата (нанесение на слизистые оболочки, обширные области поврежденной или инфицированной кожи).

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, таким образом, совместное применение с другими препаратами локального действия может приводить к усилению их всасывания. Использование больших количеств может повышать токсичность метотрексата и снижать терапевтический эффект гипогликемических средств. Препарат не следует использовать с пероральными антикоагулянтами.

Особые указания

Только для наружного применения. Не применять с согревающими компрессами. При появлении раздражения кожи прекратить применение. Избегать попадания в глаза, на слизистые оболочки, участки раздражения кожи. Не использовать препарат более 10 дней без консультации врача.

Условия хранения

В сухом месте