Инструкция по применению
Бонджигар Сироп 90 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Пакистан
Производитель: Herbion
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракт сухой лекарственных растений
Количество в упаковке: 1

Описание

Жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Экстракт сухой лекарственных растений

Состав

10 мл сиропа содержат: Активные компоненты: Эклипты белой листьев экстракт сухой - 35 мг, Пикроризы курроа корней и корневищ экстракт сухой - 35 мг, Паслена черного плодов экстракт сухой - 35 мг, Цикория обыкновенного семян экстракт сухой - 35 мг, Солодки голой корней экстракт сухой - 35 мг, Тамарикса двудомного плодов экстракт сухой - 7 мг, Редьки посевной плодов экстракт сухой - 18 мг, Барбариса остистого плодов экстракт сухой - 14 мг, Расторопши пятнистой семян и листьев экстракт сухой - 70 мг, Сферантуса индийского цветков и плодов экстракт сухой - 7 мг, Берхавии раскидистой листьев экстракт сухой - 14 мг. Вспомогательные вещества: сахароза, лимонная кислота безводная, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, ароматизатор «Тутти-фрутти» CG-2879, ароматизатор Шоколадная ваниль PDF-144, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Поскольку Бонджигар® является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания

Алкогольный стеатогепатит умеренной степени, медленно прогрессирующий (как средство монотерапии и в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза в день после еды. Для дозирования препарата рекомендуется использовать мерный стаканчик, вложенный в упаковку. Курс лечения составляет 6 недель. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению лекарственного препарата. В случае необходимости увеличения продолжительности лечения или проведения повторных курсов лечения, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница), раздражение слизистой оболочки желудка. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки описано не было. При передозировке необходимо немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно применение препарата со спазмолитиками и метоклопрамидом. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением лекарственного препарата «Бонджигар» проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При вирусном гепатите эффективность применения препарата не изучена. Сироп содержит сахарозу, что необходимо учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В одной разовой дозе (10 мл) содержится 8 г сахарозы, что соответствует 0,67 ХЕ. В случае самостоятельного применения препарата не следует превышать рекомендованные дозы и максимальные сроки лечения. В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу. Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.