Инструкция по применению
Лекрасэт боровая матка ортилия однобокая 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: ЛЕКРА-СЭТ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Ортилия однобокая (лат. Orthília secúnda) - многолетнее травянистое растение, произрастающее в лесной зоне Северного полушария, вид рода Ортилия семейства Вересковые (Ericaceae). Народные названия растения: боровая матка, бокоцветка, боровая трава, боровинка, винная трава, заячья соль, грушовник, лесная грушка, зимозелёнка. Широко применяется как в народной, так и официальной медицине, особенно для лечения гинекологических заболеваний. Боровая матка (ортилия однобокая) - Ortilia secunda широко используется в народной медицине при гинекологических заболеваниях воспалительного характера. Благодаря действию биологически активных веществ, трава боровой матки улучшает функцию всей мочеполовой системы, обладает мочегонным действием, эффективна при воспалительных процессах предстательной железы, в почках и мочевом пузыре. На основании клинических исследований доказано, что трава боровой матки вдвое ускоряет разрешение воспалительных процессов при заболеваниях женской и мужской мочеполовой сферы. Боровую матку небезуспешно применяют для лечения бесплодия, эрозии шейки матки, нарушении менструального цикла, токсикоза беременности, фибромах матки, особенно при обильных кровотечениях. Антисептическое и противовоспалительное действие травы боровой матки обусловлено гидрохиноном, освобождающимся в организме при гидролизе арбутина под действием ферментов и кислот. Раздражая почечный эпителий, арбутин оказывает также мочегонное действие. Лечебный эффект усиливается также специфическим действием флавоноидов, дубильных веществ и продуктов их гидролиза.

Состав

Трава ортилии однобокой (боровой матки) измельченная.

Форма выпуска

Трава измельченная

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника арбутина

Способ применения и дозы

1 столовую ложку (4,0 г) измельченного растительного сырья залить одним стаканом (200 мл) кипятка, Настоять 15-20 минут, процедить настой. Принимать взрослым по 1 /4 стакана (50 мл) настоя 4 раза в день во время еды, или по 1/2 стакана (100 мл) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. Возможен повторный прием в течении года. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременные и кормящие женщины.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пище Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Срок хранения после открытия

Готовый настой хранить в холодильнике не более 2-х суток.