Инструкция по применению
Брал Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Micro Labs
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид

Состав

1 таблетка содержит:метамизола натрия 500 мг, питофенона гидрохлорида 5 мг, фенпивериния бромида 0,1 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат легко всасывается из желудочно-кишечного тракта в кровь, быстро создается высокая концентрация в крови. Метаболиты не связываются с белками плазмы. Наибольшая часть дозы выводится с мочой в форме метаболитов. Метаболиты выделяются с грудным молоком. Период полувыведения (T1/2) составляет 12,7 часов. Общий клиренс 40.9 мл/мин. Более подробная информация на медицинском портале http://www.medicinform.net/

Показания

болевой синдром слабой или умеренной выраженности при спазмах гладкой мускулатуры (почечная и желчная колики, спазм кишечника, дисменорея и др.), невралгия,артралгия,миалгия,боли после диагностических и хирургических вмешательств,лихорадка при простудных и инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Способ применения и дозы

Брал принимают внутрь: взрослые и подростки старше 15 лет: 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.Дети 12-14 лет: разовая доза - 1 таблетка, максимальная суточная доза - 6 таблеток (1.5 таблетки 4 раза в сутки),8-11 лет - 0.5 таблетки, максимальная суточная доза - 4 таблетки (по 1 таблетке 4 раза в сутки),5-7 лет - 0.5 таблетки, максимальная суточная доза - 2 таблетки (по 0.5 таблетки 4 раза в сутки).

Противопоказания

гиперчувствительность,выраженные нарушения функций печени и почек,врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,тахиаритмия,коллаптоидное состояние, нарушение кроветворения,закрытоугольная глаукома,непроходимость кишечника, мегаколон,гипертрофия предстательной железы с тенденцией к накоплению остаточной мочи.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

В терапевтических дозах препарат обычно хорошо переносится.Иногда возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, очень редко - анафилактический шок).В единичных случаях - чувство жжения в эпигастральной области, сухость во рту, головная боль. Возможны - головокружение, снижение артериального давления, тахикардия, цианоз. При длительном приеме - случаи нарушения системы крови (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз).При склонности к бронхоспазму возможно провоцирование приступа.В очень редких случаях - злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), снижение потоотделения, парез аккомодации, задержка мочи.Редко (обычно при длительном приеме или назначении высоких доз) - нарушение функции почек: олигурия, анурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, окрашивание мочи в красный цвет. Обо всех побочных эффектах следует сообщать лечащему врачу.

Передозировка

Симптомы: рвота, снижение артериального давления, сонливость, спутанность сознания, тошнота, боли в эпигастральной области, нарушения функции печени и почек, судороги.Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы, аллопуринол, нарушают метаболизм в печени и повышают токсичность.Действие усиливают седативные средства и транквилизаторы, ослабляют — барбитураты, фенилбутазон и др. индукторы микросомальных ферментов печени.Др. ненаркотические анальгетики потенцируют побочные эффекты, а циклоспорин снижает плазменный уровень.

Особые указания

Метаболиты метамизола могут окрашивать мочу в красный цвет.

Условия хранения

В сухом месте