# Инструкция по применению
# Брамитоб раствор для ингаляций 75мг/мл 4мл n56

## Характеристики




Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: КЬЕЗИ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тобрамицин
Количество в упаковке: 56
Дозировка действующего вещества: 75 мг/мл

## Описание

Антибиотик группы аминогликозидов

## Действующее вещество

Тобрамицин

## Состав

тобрамицин Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 4.5 мг, натрия гидроксид 1М - до pH 4.5-5.5, серная кислота 1М - 0.4 мл до pH 4.5-5.5, вода д/и - до 1 мл.

## Форма выпуска

Раствор

## Показания

Для системного применения: тяжелые инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к тобрамицину возбудителями (сепсис, менингит, перитонит, эндокардит, инфекции дыхательных путей, инфекции кожи и мягких тканей, инфекции мочевыводящих путей, инфекции костной ткани). Для местного применения: инфекции глаз (в составе комбинированной терапии).

**Способ применения и дозы**

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Индивидуальный, в зависимости от показаний, тяжести течения заболевания, возраста пациента. Вводят в/м, в/в капельно. Применяют наружно и местно в соответствующих лекарственных формах.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к тобрамицину и другим аминогликозидам.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение тобрамицина возможно, когда предполагаемая польза лечения для матери превышает риск развития побочных эффектов у плода.

**Побочные действия**

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: ототоксическое действие, головная боль, вялость, дезориентация, нарушение нервно-мышечной передачи. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, повышение уровня печеночных трансаминаз и билирубина в крови. Со стороны системы кроветворения: анемия, гранулоцитопения, тромбоцитопения. Местные реакции: боли в месте инъекции. Со стороны обмена веществ: гипокальциемия, гипонатриемия, гипокалиемия, гипомагниемия. Прочие: возможно нефротоксическое действие, аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими препаратами**

При комбинированном применении тобрамицина с фуросемидом и этакриновой кислотой возможно усиление ототоксического действия, с другими аминогликозидами, полипептидными антибиотиками, некоторыми цефалоспоринами - возможно усиление нефротоксического действия тобрамицина, с миорелаксантами - возможно усиление их мышечно-расслабляющего действия.

**Особые указания**

Системное применение тобрамицина возможно, когда предполагаемая польза лечения превышает риск развития побочных эффектов в следующих случаях: у пациентов с нарушением функции почек, слуха, при миастении и паркинсонизме.