Инструкция по применению
Брилинта® Таблетки покрытые пленочной оболочкой 60 мг 168 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые пленочной оболочкой
Страна: Россия
Производитель: AstraZeneca
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тикагрелор
Количество в упаковке: 168
Дозировка действующего вещества: 60 мг

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые плёночной оболочкой розового цвета, с гравировкой на одной стороне.

Действующее вещество

Тикагрелор

Состав

Действующим веществом является тикагрелор. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 60 мг тикагрелора. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, кальция гидрофосфат, карбоксиметилкрахмал натрия, гипролоза, магния стеарат, гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), макрогол 400, краситель железа оксид черный (Е 172), краситель железа оксид красный (Е 172).

Форма выпуска

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

Показания

Препарат Брилинта®, применяемый одновременно с ацетилсалициловой кислотой, показан:

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.Рекомендуемая доза&bull Рекомендуемая доза &ndash одна таблетка 60 мг два раза в сутки. &bull Принимайте препарат Брилинта® ежедневно примерно в одно и то же время (например, одну таблетку утром и одну таблетку вечером).&bull Скорее всего, лечащий врач также назначит Вам ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе. Лечащий врач скажет Вам, в какой именно дозе ее принимать. Путь и (или) способ введенияВы можете принимать таблетку независимо от приема пищи.Если у Вас возникли затруднения с проглатыванием таблеткиЕсли у Вас возникли затруднения с проглатыванием таблетки, ее можно измельчить и размешать в питьевой воде следующим образом:&bull измельчите таблетку до состояния мелкого порошка, &bull всыпьте порошок в половину стакана питьевой воды,&bull размешайте и сразу же выпейте,&bull чтобы убедиться, что препарат не остался в стакане, ополосните его дополнительной половиной стакана питьевой воды и выпейте. В некоторых случаях врач может назначить Вам введение препарата через зонд, установленный в желудке. Продолжительность примененияПрепарат Брилинта® предназначен для длительного применения. Принимайте препарат до тех пор, пока лечащий врач назначает Вам его. Если Вы приняли препарата Брилинта® больше, чем следовалоЕсли Вы приняли препарата Брилинта® больше, чем следовало, свяжитесь с врачом или незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение. Возьмите упаковку с препаратом с собой. У Вас может быть повышен риск развития кровотечения. Если Вы забыли принять препарат Брилинта® Если Вы забыли принять дозу препарата, просто примите следующую дозу как обычно.Не принимайте двойную дозу препарата (две дозы одновременно), чтобы компенсировать пропущенную дозу. Если Вы прекратили прием препарата Брилинта® Не прекращайте прием препарата Брилинта® , не проконсультировавшись с лечащим врачом.Продолжайте принимать препарат, пока лечащий врач назначает Вам его. Если Вы хотите прекратить прием препарата, сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом. Это необходимо потому, что оценка риска и пользы препарата Брилинта® основана на регулярном приеме препарата.При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Брилинта®: Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, кальция гидрофосфат, карбоксиметилкрахмал натрия, гипролоза, магния стеарат, гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), макрогол 400, краситель железа оксид черный (Е 172), краситель железа оксид красный (Е 172).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат Брилинта®, если Вы беременны или планируете беременность. Женщинам следует использовать надежные методы контрацепции, чтобы избежать беременности в период лечения этим препаратом. Период грудного вскармливания Не принимайте препарат Брилинта®, если Вы кормите грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.Незамедлительно обратитесь к врачу при развитии следующих признаков серьезных нежелательных реакций &ndash Вам может потребоваться срочная медицинская помощь:&bull Признаки кровотечения, такие как:- тяжелое кровотечение или кровотечение, которое невозможно остановить, или продолжительное кровотечение - моча розового, красного или коричневого цвета (гематурия) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10) - рвота красной кровью или рвота, которая выглядит как « кофейная гуща» , красный или черный стул (похожий на деготь) (признаки желудочно-кишечного кровотечения) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10) - кашель с кровью или сгустками крови (кровохарканье) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10) - внутреннее кровотечение (например, ретроперитонеальное кровотечение), признаками которого могут быть головокружение и ощущение дурноты (может возникать нечасто & ndash не более чем у 1 человека из 100).&bull Признаки определенного типа инсульта, который вызван кровоизлиянием в мозг (внутричерепное кровоизлияние), такие как:- внезапное онемение или слабость руки, ноги или лица, в особенности если они проявляются только с одной стороны тела - внезапная спутанность сознания, нарушение речи или затруднения с пониманием других - внезапное нарушение ходьбы или потеря равновесия или координации - внезапное головокружение или внезапная сильная головная боль без видимой причины.Внутричерепное кровоизлияние может возникать нечасто &ndash не более чем у 1 человека из 100.&bull Обморок (синкопе) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10):- временная потеря сознания из-за резкого снижения притока крови к мозгу.&bull Признаки нарушения свертываемости крови, называемого тромботической тромбоцитопенической пурпурой, такие как:- лихорадка и пурпурные пятна (называемые пурпурой) на коже или во рту, с пожелтением кожи или глаз (желтуха) или без него, необъяснимая сильная усталость или спутанность сознания.

Сообщалось о развитии тромботической тромбоцитопенической пурпуры у небольшого количества пациентов, получавших тикагрелор (частота неизвестна &ndash исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно). &bull Признаки тяжелой аллергической реакции, включая ангионевротический отек (может возникать нечасто &ndash не более чем у 1 человека из 100):- отек лица, губ, ротоглотки или языка, который может затруднять дыхание или глотание. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы заметили что-либо из следующего (также см. раздел 2 листка-вкладыша, подраздел « Сообщите лечащему врачу, если во время лечения препаратом Брилинта® Вы отметили»):&bull Ощущение нехватки воздуха (одышка) &ndash может возникать очень часто (у более чем 1 человека из 10).&bull Признаки нерегулярного дыхания (центральное апноэ сна и дыхание Чейна-Стокса) &ndash может возникать у небольшого числа пациентов, принимающих тикагрелор (частота неизвестна &ndash исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно).Другие нежелательные реакцииОчень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10):&bull повышение концентрации мочевой кислоты в крови (обнаруживают при анализе крови)&bull склонность к образованию кровоподтеков, кровоподтеки без видимых причин (спонтанные гематомы), повышенная кровоточивость (геморрагический диатез) &ndash признаки кровотечения, вызванного заболеванием кровиЧасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):& bull кровоподтеки (экхимоз), кровоизлияния в кожу, маленькие красные или пурпурные точечные пятна на коже, вызванные кровоизлиянием из капилляров (петехии) &ndash признаки подкожного или кожного кровоизлияния&bull носовое кровотечение&bull головокружение&bull ощущение, что комната вращается (вертиго)&bull головная боль&bull диарея&bull тошнота&bull расстройство пищеварения (диспепсия)&bull запор&bull кожный зуд&bull кожная сыпь&bull сильная боль и припухлость суставов &ndash возможные признаки подагры и подагрического артрита, которые связаны с повышенным содержанием мочевой кислоты в крови&bull головокружение, ощущение дурноты или помутнение зрения &ndash признаки низкого артериального давления&bull более сильное кровотечение, чем обычно, после операции или медицинской манипуляции, после порезов (например, во время бритья), после травмы (например, ушиб, гематома, травматическое кровотечение) &bull кровотечение из десен&bull кровотечение из язвы желудка&bull повышение содержания креатинина в крови (обнаруживают при анализе крови) Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):&bull спутанность сознания&bull кровоизлияние в глаз (например, в конъюнктиву, в сетчатку глаза, внутриглазное кровоизлияние)&bull кровотечение из влагалища, которое сильнее или происходит в другое время по сравнению с обычным менструальным

кровотечением, кровь в сперме, кровотечение из влагалища у женщин в постменопаузе &ndash признаки кровотечения из половых путей&bull кровотечение из опухоли (например, кровотечение из опухоли (рак) мочевого пузыря, из опухоли (рак) желудка, из опухоли (рак) толстой кишки)&bull кровоизлияние в ухо&bull болезненный отек суставов или мышц &ndash признаки кровоизлияния в суставы или мышцыНеизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):&bull медленный сердечный ритм (брадиаритмия)&bull нарушение в электрической системе сердца, которое выявляется при электрокардиографии (атриовентрикулярная блокада).

Передозировка

Если Вы приняли препарата Брилинта® больше, чем следовало, свяжитесь с врачом или незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение. Возьмите упаковку с препаратом с собой. У Вас может быть повышен риск развития кровотечения.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это необходимо потому, что препарат Брилинта® может повлиять на действие некоторых препаратов, и некоторые препараты могут повлиять на действие препарата Брилинта®. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: Особенно важно сообщить лечащему врачу, что Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов, которые увеличивают риск кровотечения:

Особые указания

Перед приемом препарата Брилинта® проконсультируйтесь с лечащим врачом, если: Если что-либо из перечисленного выше относится к Вам (или Вы не уверены), перед приемом препарата Брилинта® проконсультируйтесь с лечащим врачом и/или стоматологом. Сообщите лечащему врачу, если во время лечения препаратом Брилинта® Вы отметили (также см. раздел 4 листка-вкладыша): Препарат Брилинта® с пищей и напитками Сообщите лечащему врачу, если Вы употребляете грейпфрутовый сок в больших объемах (например, по 200 мл 3 раза в сутки). Дети и подростки Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность препарата Брилинта® у них не установлены Управление транспортными средствами и работа с механизмами Маловероятно, что препарат Брилинта® окажет влияние на Вашу способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Если во время лечения препаратом Брилинта® у Вас возникает головокружение или спутанность сознания, будьте осторожны при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте препарат Брилинта® после истечения срока годности, указанного на блистере, картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца. Храните препарат при температуре не выше 30 ºС. Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.