Инструкция по применению
Брилинта® Таблетки покрытые пленочной оболочкой 90 мг 168 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые пленочной оболочкой
Страна: Россия
Производитель: AstraZeneca
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тикагрелор
Количество в упаковке: 168
Дозировка действующего вещества: 90 мг

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые плёночной оболочкой жёлтого цвета, с гравировкой на одной стороне.

Действующее вещество

Тикагрелор

Состав

Действующим веществом является тикагрелор. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 90 мг тикагрелора. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, кальция гидрофосфат, карбоксиметилкрахмал натрия, гипролоза, магния стеарат, гипромеллоза 2910, титана диоксид, тальк, макрогол 400, краситель железа оксид желтый.

Форма выпуска

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

Показания

Препарат Брилинта®, применяемый одновременно с ацетилсалициловой кислотой, показан:

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.Рекомендуемая доза&bull Начальная доза составляет две таблетки 90 мг одновременно (нагрузочная доза 180 мг). Эту дозу обычно дают в медицинском учреждении.& bull После приема начальной дозы обычная доза составляет одну таблетку 90 мг два раза в сутки. &bull Принимайте препарат Брилинта® ежедневно примерно в одно и то же время (например, одну таблетку утром и одну таблетку вечером).& bull Скорее всего, лечащий врач также назначит Вам ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе. Лечащий врач скажет Вам, в какой именно дозе ее принимать. Путь и (или) способ введенияВы можете принимать таблетку независимо от приема пищи. Если у Вас возникли затруднения с проглатыванием таблетки (таблеток)Если у Вас возникли затруднения с проглатыванием таблетки (таблеток), ее (их) можно измельчить и размешать в питьевой воде следующим образом:&bull измельчите таблетку (таблетки) до состояния мелкого порошка,&bull всыпьте порошок в половину стакана питьевой воды,&bull размешайте и сразу же выпейте,& bull чтобы убедиться, что препарат не остался в стакане, ополосните его дополнительной половиной стакана питьевой воды и выпейте.В некоторых случаях врач может назначить Вам введение препарата через зонд, установленный в желудке. Продолжительность применения После острого коронарного синдрома лечение рекомендуется проводить в течение 12 месяцев, после острого ишемического инсульта или транзиторной ишемической атаки &ndash в течение 30 дней, если только лечащий врач не назначит иначе.Через один год после острого коронарного синдрома лечащий врач может продолжить Ваше лечение препаратом в более низкой дозе (таблетки 60 мг) два раза в сутки. Если Вы приняли препарата Брилинта® больше, чем следовало Если Вы приняли препарата Брилинта® больше, чем следовало, свяжитесь с врачом или незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение. Возьмите упаковку с препаратом с собой. У Вас может быть повышен риск развития кровотечения. Если Вы забыли принять препарат Брилинта® Если Вы забыли принять дозу препарата, просто примите следующую дозу как обычно.Не принимайте двойную дозу препарата (две дозы одновременно), чтобы компенсировать пропущенную дозу. Если Вы прекратили прием препарата Брилинта® Не прекращайте прием препарата Брилинта® , не проконсультировавшись с лечащим врачом.Принимайте препарат до тех пор, пока лечащий врач назначает Вам его. Если Вы хотите прекратить прием препарата, сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом. Это необходимо потому, что оценка риска и пользы препарата Брилинта® основана на регулярном приеме препарата.При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Брилинта®: Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, кальция гидрофосфат, карбоксиметилкрахмал натрия, гипролоза, магния стеарат, гипромеллоза 2910, титана диоксид, тальк, макрогол 400, краситель железа оксид желтый.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат Брилинта®, если Вы беременны или планируете беременность. Женщинам следует использовать надежные методы контрацепции, чтобы избежать беременности в период лечения этим препаратом. Период грудного вскармливания Не принимайте препарат Брилинта®, если Вы кормите грудью.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.Незамедлительно обратитесь к врачу при развитии следующих признаков серьезных нежелательных реакций &ndash Вам может потребоваться срочная медицинская помощь:&bull Признаки кровотечения, такие как:- тяжелое кровотечение или кровотечение, которое невозможно остановить, или продолжительное кровотечение - моча розового, красного или коричневого цвета (гематурия) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10) - рвота красной кровью или рвота, которая выглядит как « кофейная гуща» , красный или черный стул (похожий на деготь) (признаки желудочно-кишечного кровотечения) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10) - кашель с кровью или сгустками крови (кровохарканье) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10) - внутреннее кровотечение (например, ретроперитонеальное кровотечение), признаками которого могут быть головокружение и ощущение дурноты (может возникать нечасто & ndash не более чем у 1 человека из 100).&bull Признаки определенного типа инсульта, который вызван кровоизлиянием в мозг (внутричерепное кровоизлияние), такие как:- внезапное онемение или слабость руки, ноги или лица, в особенности если они проявляются только с одной стороны тела - внезапная спутанность сознания, нарушение речи или затруднения с пониманием других - внезапное нарушение ходьбы или потеря равновесия или координации - внезапное головокружение или внезапная сильная головная боль без видимой причины.Внутричерепное кровоизлияние может возникать нечасто &ndash не более чем у 1 человека из

100.&bull Обморок (синкопе) (может возникать часто &ndash не более чем у 1 человека из 10):- временная потеря сознания из-за резкого снижения притока крови к мозгу.&bull Признаки нарушения свертываемости крови, называемого тромботической тромбоцитопенической пурпурой, такие как:- лихорадка и пурпурные пятна (называемые пурпурой) на коже или во рту, с пожелтением кожи или глаз (желтуха) или без него, необъяснимая сильная усталость или спутанность сознания. Сообщалось о развитии тромботической тромбоцитопенической пурпуры у небольшого количества пациентов, получавших тикагрелор (частота неизвестна &ndash исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно). &bull Признаки тяжелой аллергической реакции, включая ангионевротический отек (может возникать нечасто &ndash не более чем у 1 человека из 100):- отек лица, губ, ротоглотки или языка, который может затруднять дыхание или глотание. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы заметили что-либо из следующего (также см. раздел 2 листка-вкладыша, подраздел « Сообщите лечащему врачу, если во время лечения препаратом Брилинта® Вы отметили»):&bull Ощущение нехватки воздуха (одышка) &ndash может возникать очень часто (у более чем 1 человека из 10).&bull Признаки нерегулярного дыхания (центральное апноэ сна и дыхание Чейна-Стокса) &ndash может возникать у небольшого числа пациентов, принимающих тикагрелор (частота неизвестна &ndash исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно).Другие нежелательные реакцииОчень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10):&bull повышение концентрации мочевой кислоты в крови (обнаруживают при анализе крови)&bull склонность к образованию кровоподтеков, кровоподтеки без видимых причин (спонтанные гематомы), повышенная кровоточивость (геморрагический диатез) &ndash признаки кровотечения, вызванного заболеванием кровиЧасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):& bull кровоподтеки (экхимоз), кровоизлияния в кожу, маленькие красные или пурпурные точечные пятна на коже, вызванные кровоизлиянием из капилляров (петехии) &ndash признаки подкожного или кожного кровоизлияния&bull носовое кровотечение&bull головокружение&bull ощущение, что комната вращается (вертиго)&bull головная боль&bull диарея&bull тошнота&bull расстройство пищеварения (диспепсия)&bull запор&bull кожный зуд&bull кожная сыпь&bull сильная боль и припухлость суставов &ndash возможные признаки подагры и подагрического артрита, которые связаны с повышенным содержанием мочевой кислоты в крови&bull головокружение, ощущение дурноты или помутнение зрения &ndash признаки низкого артериального давления&bull более сильное кровотечение, чем обычно, после операции или медицинской манипуляции, после порезов (например, во время бритья), после травмы (например, ушиб, гематома, травматическое кровотечение)

&bull кровотечение из десен&bull кровотечение из язвы желудка&bull повышение содержания креатинина в крови (обнаруживают при анализе крови) Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):&bull спутанность сознания&bull кровоизлияние в глаз (например, в конъюнктиву, в сетчатку глаза, внутриглазное кровоизлияние)&bull кровотечение из влагалища, которое сильнее или происходит в другое время по сравнению с обычным менструальным кровотечением, кровь в сперме, кровотечение из влагалища у женщин в постменопаузе &ndash признаки кровотечения из половых путей&bull кровотечение из опухоли (например, кровотечение из опухоли (рак) мочевого пузыря, из опухоли (рак) желудка, из опухоли (рак) толстой кишки)&bull кровоизлияние в ухо&bull болезненный отек суставов или мышц &ndash признаки кровоизлияния в суставы или мышцыНеизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):&bull медленный сердечный ритм (брадиаритмия)&bull нарушение в электрической системе сердца, которое выявляется при электрокардиографии (атриовентрикулярная блокада).

Передозировка

Если Вы приняли препарата Брилинта® больше, чем следовало, свяжитесь с врачом или незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение. Возьмите упаковку с препаратом с собой. У Вас может быть повышен риск развития кровотечения.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это необходимо потому, что препарат Брилинта® может повлиять на действие некоторых препаратов, и некоторые препараты могут повлиять на действие препарата Брилинта®. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: Особенно важно сообщить лечащему врачу, что Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов, которые увеличивают риск кровотечения:

Особые указания

Перед приемом препарата Брилинта® проконсультируйтесь с лечащим врачом, если: Если что-либо из перечисленного выше относится к Вам (или Вы не уверены), перед приемом препарата Брилинта® проконсультируйтесь с лечащим врачом и/или стоматологом. Сообщите лечащему врачу, если во время лечения препаратом Брилинта® Вы отметили (также см. раздел 4 листка-вкладыша): Препарат Брилинта® с пищей и напитками Сообщите лечащему врачу, если Вы употребляете грейпфрутовый сок в больших объемах (например, по 200 мл 3 раза в сутки). Дети и подростки Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность препарата Брилинта® у них не установлены Управление транспортными средствами и работа с механизмами Маловероятно, что препарат Брилинта® окажет влияние на Вашу способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Если во время лечения препаратом Брилинта® у Вас возникает головокружение или спутанность сознания, будьте осторожны при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте препарат Брилинта® после истечения срока годности, указанного на блистере, картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца. Храните препарат при температуре не выше 30 ºС. Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.