Инструкция по применению
БРОМГЕКСИН ТАБ. 8 МГ №50

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бромгексин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 8 мг



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с риской с одной стороны и фасками с двух сторон.

Действующее вещество

Бромгексин

Состав

Каждая таблетка содержит:Активное вещество: Бромгексина гидрохлорид - 8,0 мг. Вспомогательные вещества:лактозы моногидрат (сахар молочный) - 101,5 мг, крахмал кукурузный - 15,0 мг, повидон (поливинилпирролидон) - 4,5 мг, магния стеарат -1,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь бромгексин практически полностью (99% всасывается в течение 30 минут. Биодоступность составляет 80% вследствие эффекта "первого прохождения" через печень. В плазме бромгексин связывается с белками проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. В печени бромгексин подвергается деметилированию и окислению. Период полувыведения составляет 15 ч вследствие медленной обратной диффузии из тканей. Экскретируется почками. При хронической почечной недостаточности нарушается выведение метаболитов бромгексина. При многократном применении бромгексин может кумулировать.

Показания

Бронхолегочные заболевания сопровождающие образованием мокроты повышенной вязкости (бронхиальная астма муковисцидоз туберкулез пневмания трахеобронхит обструктивный бронхит бро яхоэктазы эмфизема легких пневмокониоз) травмы грудной клетки пред- и послеоперационный период.

Способ применения и дозы

Бромгексин применяют внутрь независимо от приема пищи. Взрослым назначают по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, детям от 3 до 5 лет - 2 мг. от 6 до 14 лет - 4 мг 3 раза в день. Курс лечения - от 4 до 28 дней.В процессе лечения рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости что поддерживает секретолическое действие бромгексин.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата,беременность (1 триместр), период лактации,детский возраст до 3-х лет.

Побочные действия

Редко при длительном приеме препарата возможны тошнота рвота диспепсические явления обострение язвенной болезни аллергические реакции (кожная сыпь ринит и др.) повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови.В этих случаях следует отменить препарат.

Взаимодействие с другими препаратами

Бромгексин возможно назначать одновременно с другими препаратами применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.Бромгексин не назначают одновременно с лекарственными средствами содержащими кодеин так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.Бромгексин способствует проникновению антибиотиков (эритромицин цефалексин окситетраклин) в легочную ткань.Бромгексин не совместим со щелочными растворами.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.