Инструкция по применению
Бромкамфора Таблетки 250 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бромкамфора
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Описание

Таблетки белого или серовато-белого цвета с вкраплениями кристаллов бромкамфоры рацемической, плоскоцилиндрические с риской и фаской, с характерным запахом камфоры.

Действующее вещество

Бромкамфора

Состав

Активного вещества: бром камфоры рацемической - 250 мг,Вспомогательных веществ: лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный, кислота стеариновая - до получения таблетки массой 450 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Легко абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Проникает через гистогематические барьеры, включая плацентарный. Гидроксилируется в печени до оксиметаболитов, которые в виде глюкуронидов выводятся почками.

Показания

Повышенная возбудимость, астения, кардионеврозы (кардиалгия, тахикардия, лабильность артериального давления).

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Взрослым и детям старше 14 лет - по 1-2 таблетке 2-3 раза в день, детям в возрасте 7-10 лет по 1 таблетке 2 раза в день, детям в возрасте 10-14 лет - по 1 таблетке 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза: для взрослых и детей старше 14 лет - 1,5 г, для детей в возрасте 7-10 лет - 0,5 г, для.детей в возрасте 10-14 лет - 0,75 г. Курс лечения - 10-15 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность к камфоре или бромидам, печеночная и/или почечная недостаточность, непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 7 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность и период грудного вскармливания является противопоказанием.

Побочные действия

Аллергические реакции, заторможенность, сонливость, диспепсические явления.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, анурия, делирий, мышечное подергивание, эпилептиформные судороги, угнетение центральной нервной системы, затрудненное дыхание, характерный запах камфоры в выдыхаемом воздухе, дыхательная недостаточность, кома. Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных и активированного угля внутрь. При судорогах - в /в диазепам или быстродействующие барбитураты (тиопентал натрия). Гемодиализ с липидным диализатом.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.