Инструкция по применению
Бронкаст Таблетки жевательные 5мг 30 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Индия
Производитель: Micro Labs
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Монтелукаст
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 0

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки светло-розового цвета неоднородной окраски с вкраплениями белого и темного цвета с гравировкой «I34» на одной стороне и без гравировки на другой стороне, с характерным запахом.

Действующее вещество

Монтелукаст

Состав

Препарат Бронкаст содержит: Действующим веществом является монтелукаст. Каждая таблетка жевательная содержит 5 мг монтелуката (в виде натриевой соли). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: маннитол, целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, гипролоза, магния стеарат, аспартам, ароматизатор вишневый, краситель железа оксид красный (Е172). Препарат Бронкаст содержит аспартам (см. раздел «Особые указания»).

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Противопоказания

Не давайте Вашему ребенку препарат Бронкаст:если у ребенка аллергия на монтелукаст или любые другие компоненты препарата;если ребенок младше 6 лет (для дозировки 5 мг).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Препарат Бронкаст в дозировке 5 мг показан к применению у детей в возрасте от 6 до 14 лет. Информация, представленная в этом разделе, относится к действующему веществу монтелукаст. Врач оценит, следует ли принимать монтелукаст во время беременности. Неизвестно, выделяется ли монтелукаст с грудным молоком. Если Вы кормите грудью, или собираетесь кормить грудью, проконсультируйтесь с врачом перед приемом препарата.

Передозировка

Если Ваш ребенок принял препарата Бронкаст больше, чем следовало Если Ваш ребенок принял больше таблеток препарата Бронкаст, чем назначено, немедленно обратитесь за медицинской помощью. По возможности, возьмите с собой данный листок-вкладыш и/или упаковку препарата, чтобы показать врачу, какой препарат принял ребенок. Наиболее частые симптомы при передозировке монтелукаста у взрослых и детей: боль в животе, сонливость, чувство жажды, головная боль, рвота, психомоторное возбуждение.

Условия хранения

Храните при температуре ниже 25 °C. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.