Инструкция по применению
Бронхикум ® ТР, эликсир 130 г

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: Санофи
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Первоцвета корней экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Описание

Бронхикум® ТР — препарат содержит смесь экстрактов травы тимьяна обыкновенного и корня первоцвета весеннего, представляющих собой сложный комплекс биологически активных веществ. Препарат оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и бронхолитическое действие, способствует снижению вязкости мокроты и ускорению её выведения. Эликсир подходит для комплексного лечения бронхита, трахеита и других воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой, у взрослых и детей с 6 месяцев. • Применяется в составе комплексной терапии бронхита, трахеита и других воспалительных заболеваний, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой/ влажным кашлем • Содержит экстракты тимьяна и первоцвета • Подходит детям с 6 месяцев и взрослым • Обладает противовоспалительным и отхаркивающим действием Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Бронхикум® ТР эликсир, (ЛСР-005678/08) - показания; противопоказания и т.д. см. в государственном реестре лекарственных средств.

Действующее вещество

Первоцвета корней экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Состав

Жидкий экстракт травы тимьяна (1:2-2.5)* 5 г, жидкий экстракт корней первоцвета (1:2-2.5)** 2.5 г. * Экстрагент: раствор аммиака 10%, глицерол 85%, этанол 90 об.%, вода (в соотношении 1:20:70:109). ** Экстрагент: этанол 70%. Вспомогательные вещества: натрия бензоат, сахарный сироп специальный (смесь сахарозы, декстрозы, фруктозы), вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

В соответствии с Международной конвенцией (EMEAHMPWG11/99) при проведении клинических исследований препаратов растительного происхождения не требуется изолированное исследование фармакокинетических параметров.

Показания

— в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (в т.ч. бронхита, трахеита), сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь. Взрослым и подросткам - по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 6 раз/сут. Детям от 5 до 12 лет - по 1 чайной ложке эликсира (5 мл) до 4 раз /сут. Детям от 1 года до 4 лет - по 1/2 чайной ложки (2.5 мл) до 3 раз/сут. Препарат следует принимать через равные промежутки времени в течение суток. Средний курс лечения составляет 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

— хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации);— тяжелые нарушения функции печени;— тяжелые нарушения функции почек;— врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы;— детский возраст до 1 года;— повышенная чувствительность к компонентам препарата.;В связи с содержанием в препарате этилового спирта эликсир Бронхикум; ТП не следует применять у больных алкоголизмом.;С осторожностью и только после консультации с врачом следует принимать эликсир пациентам с заболеваниями печени, заболеваниями и травмами головного мозга, эпилепсией.

Условия хранения

В сухом месте