Инструкция по применению
Бронхипрет Сироп 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Первоцвета корней экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Описание

.

Действующее вещество

Первоцвета корней экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Состав

100 г:жидкий экстракт травы тимьяна (Thymus vulgaris) (1:2-2.5)* 15 гжидкий экстракт листьев плюща (Hedera helix) (1:1)** 1.5 г* Экстрагент: по DAB 10.** Экстрагент: этанол 70% (в объемном отношении).Содержание этанола: 19% (в объемном отношении). Вспомогательные вещества: вода очищенная, мальтитный сироп, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

- в качестве отхаркивающего средства при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты (трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды.При назначении соответственно возрасту: Детям в возрасте от 3 месяцев до 12 месяцев: по 10-16 капель 3 раза/сут.Детям старше 1 года: по 17 капель (с прибавлением по 3 капли на каждый дополнительный год жизни) 3 раза/сут.При назначении соответственно массе тела:Детям в возрасте от 3 месяцев до 12 месяцев: по 10–16 капель 3 раза/сут.Детям старше 1 года: по (общее число капель = 1 капля на кг массы тела + 10 капель) 3 раза/сут.С использованием прилагаемого мерного стаканчика:Детям в возрасте от 3 до 12 месяцев - 1.1 мл 3 раза /сут; детям в возрасте от 1 года до 2 лет - 2.2 мл 3 раза/сут; детям в возрасте от 2 до 6 лет - 3.2 мл 3 раза/сут; детям в возрасте от 6 до 12 лет - 4.3 мл 3 раза/сут; подросткам с 12 лет и взрослым - 5.4 мл 3 раза/сут.Неразведенный сироп Бронхипрет рекомендуется запивать водой.Перед употреблением содержимое флакона следует взбалтывать.Курс лечения – 10-14 дней. Увеличение продолжительности терапии и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

- детский возраст до 3 месяцев;- повышенная чувствительность к компонентам препарата.Вследствие наличия этанола не рекомендуется назначать препарат при алкоголизме, эпилепсии, заболеваниях печени, заболеваниях и травмах головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется принимать препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: возможны боли в области желудка, рвота, диарея.

Взаимодействие с другими препаратами

Сироп Бронхипрет не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.Возможна комбинация с антибактериальными лекарственными средствами.

Особые указания

Если при применении препарата в течение 10–14 дней симптомы заболевания сохраняются, следует обратиться за консультацией к врачу.Препарат содержит 7% этанола (в объемном отношении). Максимально рекомендуемая разовая доза препарата для взрослых 5.4 мл содержит 0.297 г этанола.Препарат следует с осторожностью назначать детям (из-за возможного негативного влияния этанола). Препарат может назначаться больным сахарным диабетом, т.к. разовая доза содержит менее 0.03 учитываемых хлебных единиц (ХЕ).При длительном хранении сироп Бронхипрет может помутнеть, что не влияет на его эффективность.

Условия хранения

В сухом месте