Инструкция по применению
Бронхофитол плющ Сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Фитофарм Кленка
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракт листьев плюща
Количество в упаковке: 1



Описание

Опалесцирующая жидкость коричневого цвета с характерным запахом. В процессе хранения возможно образование небольшого осадка.

Действующее вещество

Экстракт листьев плюща

Состав

1 мл препарата содержит: активный компонент: плюща обыкновенного листьев экстракт сухой (4-8:1)* - 8,25 мг, вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (некристаллизующийся), камедь ксантановая, калия сорбат, лимонная кислота безводная, вода очищенная. * Плюща обыкновенного листьев экстракт сухой производится из листьев вечнозеленой древовидной лианы плюща обыкновенного - Hedera helix L. семейства Аралиевых - Aшliaceae, экстракцией этанолом (спиртом этиловым) 30 % (м/м) (соотношение сырья к полученному экстракту (4-8:1)).

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Так как препарат содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь. Возраст Доза Частота приема Дети с 2 до 5 лет по 2 мл сиропа 2 раза в день Дети с 6 до 11 лет по 4 мл сиропа 2 раза в день Дети с 12 лет и взрослые по 6 мл сиропа 2 раза в день Для дозирования используют мерную ложку, вложенную в упаковку (2 мл сиропа - 1/2 мерной ложки, 4 мл сиропа - 1 мерная ложка, 6 мл сиропа - 1,5 мерные ложки). Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения составляет 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов заболевания продолжить терапию еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния пациента необходимо обратиться к врачу. Перед применением взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства Аралиевые, беременность, период грудного вскармливания, дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 2 лет (из-за общего риска обострения респираторных симптомов при применении муколитических препаратов).

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь, одышка, анафилактическая реакция), нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. При возникновении серьезных побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

При приеме больших доз (в 3 раза превышающих рекомендованные суточные дозы) может развиться тошнота, рвота, диарея, возбужденное состояние. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат не содержит спирт, сахар, красители и ароматизаторы. Не следует принимать препарат в дозах, превышающих рекомендованные в инструкции. При отсутствии эффекта на фоне лечения препаратом в течение 7 дней или ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу. Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, необходимо немедленно обратиться к врачу. Непрекращающийся или рецидивирующий кашель у детей в возрасте 2-4 лет требует постановки медицинского диагноза до начала лечения. Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 мл сиропа содержит до 469 мг сорбитола, что соответствует примерно 0,03 углеводной (хлебной) единицы (ХЕ). Из-за содержания сорбитола препарат может оказывать легкое слабительное действие.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 0С. Хранить в недоступном для детей месте.