Инструкция по применению
Бронхохелп Сироп 5 мл 8 шт

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Фармвилар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тимьяна обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 8

Описание

Прозрачный или с опалесценцией раствор с характерным запахом от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, возможны оттенки красного, желтого или зеленого цвета. В процессе хранения возможно образование осадка.

Действующее вещество

Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Состав

В 1 мл сиропа содержится: активный компонент: тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий - 150,00 мг, вспомогательные вещества: ароматизатор розовый – 0,004 мг, ароматизатор медовый – 0,50 мг, ароматизатор вишневый – 0,40 мг, калия сорбат – 1,50 мг, сироп инвертированный 70% – 175,676 мг, декстроза – 245,00 мг, сахароза – 288,00 мг, лимонной кислоты моногидрат – 1,181 мг, вода очищенная – до 1 мл. Описание активного компонента Тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий (Тимьян обыкновенный – Thymus vulgaris L., семейства Яснотковых – Lamiaceae). Соотношение сырья к экстрагенту Травы тимьяна обыкновенного – 1000 г Глицерол (глицерин) – 40 г Этанол (спирт этиловый) 40% – до 1000 мл.

Форма выпуска

Сироп

Показания

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другого режима дозирования: - взрослым и детям старше 12 лет назначают внутрь после еды по 10 мл сиропа (2 чайные ложки сиропа / 1 пакетик по 10 мл / 2 пакетика по 5 мл) 3 раза в сутки, - детям от 6 до 12 лет – по 5 мл (1 чайная ложка / 1 пакетик по 5 мл) 3 раза в сутки, - детям от 2 до 6 лет – по 5 мл (1 чайная ложка / 1 пакетик по 5 мл) 2 раза в сутки, - детям от 1 до 2 лет – по 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 3 раза в сутки, - детям от 6 до 12 месяцев – по 2,5 мл (1/2 чайной ложки) 2 раза в сутки. Сироп от кашля следует принимать через равные промежутки времени в течение суток. Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания. Применять препарат у детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет следует по назначению и под контролем врача. В связи с тем, что возможно образование осадка, перед применением необходимо встряхивать флакон или размять пакетик между пальцами.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к тимьяну или любому другому растению из семейства Яснотковые (Lamiaceae), а также к другим компонентам препарата, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, фруктозная мальабсорбция, недостаточность ферментов сахаразы и изомальтазы, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), тяжелые нарушения функции печени и почек, детский возраст (до 6 месяцев). Алкоголизм (в связи с содержанием в препарате этилового спирта).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нежелательные эффекты классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна – реакции гиперчувствительности (в том числе анафилактический шок). Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: частота неизвестна – диспепсия, гастрит. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна – ангионевротический отек, кожная сыпь, крапивница. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Сироп Бронхохелп® содержит 4,9 объемных% спирта этилового. Содержание абсолютного этилового спирта в граммах в максимальных разовых и суточных дозах препарата. Максимальная разовая и максимальная суточная дозы Количество абсолютного этилового спирта, в граммах Взрослые и дети старше 12 лет: Разовая доза 10 мл Суточная доза 30 мл Дети от 6 до 12 лет Разовая доза 5 мл Суточная доза 15 мл Дети от 2 до 6 лет Разовая доза 5 мл Суточная доза 10 мл Дети от 1 до 2 лет Разовая доза 2,5 мл Суточная доза 7,5 мл Дети от 6 до 12 месяцев Разовая доза 2,5 мл Суточная доза 5 мл В случае если улучшения состояния пациента не наступает или в случае появления приступов удушья, гнойной мокроты, а также при повышении температуры следует немедленно обратиться к врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом Содержание усваиваемых углеводов в 5 мл сиропа соответствует 0,3 ХЕ.В период приема препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

Для флаконов: При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (в пачке картонной). Для пакетиков: При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.