Инструкция по применению
Бронхоплант сироп 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тимьяна обыкновенного травы экстракт
Количество в упаковке: 1



Описание

Жидкость коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Состав

100 г сиропа содержит: тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий, с содержанием тимола 0,028 %-9,00 г.Вспомогательные вещества:Калия сорбат 0,10 г, лимонной кислоты моногидрат 0,08 г, колер карамельный 0,20 г, глицерол (глицерин) 17,00 г, сорбитол жидкий (некристаллизирующийся) 45,00 г, вода очищенная 28,62 г.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Действие препарата является результатом совокупного действия активных веществ тимьяна обыкновенного травы экстракта, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным, все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (в том числе бронхит, трахеит, трахеобронхит, коклюш).

Способ применения и дозы

Внутрь, независимо от приема пищи.Если врач не назначил иной дозировки, то препарат принимают:Взрослые и дети старше 12 лет: 2-3 чайные ложки (10-15) сиропа 3-4 раза в день,Дети от 5 до 12 лет: 1-2 чайные ложки (5-10 мл) сиропа 3-4 раза в день,Дети от 1 года до 5 лет: 1 чайная ложка (5 мл) сиропа 2-3 раза в день. Сироп можно принимать не разбавляя или разбавить водой.Длительность применения препарата определяется терапевтической необходимостью и продолжительностью заболевания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, декомпенсация сердечного ритма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, наследственная непереносимость фруктозы, дефицит сахаразы /изомальтазы, глюкозогалактозная мальабсорбция, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется принимать во время беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием достаточного опыта клинического применения у данной категории пациентов.

Побочные действия

Возможно возникновение аллергических реакций.Из-за содержания сорбитола, при приеме препарата возможны раздражение слизистой оболочки желудка, диарея.При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Бронхоплант® не следует одновременно применять с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Вследствие содержания этанола детям до 12 лет следует принимать препарат по рекомендации и под наблюдением врача. Содержание этилового спирта в препарате не более 4%.В одной чайной ложке препарата (5 мл) содержится не более 0,16 г абсолютного этилового спирта (то есть безводного этилового спирта).Для детей от 1 года до 5 лет в максимальной разовой дозе содержится не более 0,16 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе - не более 0,48 г абсолютного этилового спирта,для детей от 5 до 12 лет в максимальной разовой дозе содержится не более 0,32 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе - не более 1,28 г абсолютного этилового спирта,для взрослых и детей старше 12 лет в максимальной разовой дозе содержится не более 0,48 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе - не более 1,92 г абсолютного этилового спирта. В 100 г препарата содержится 31,5 г сорбитола (в перерасчете на безводный сорбитол).В 1 чайной ложке сиропа (5 мл) содержится 1,85 г сорбитола, что соответствует 0,15 хлебных единиц.При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 3-5 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмамиПри применении препарата Бронхоплант® следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.