Инструкция по применению
Бронхорус Таблетки 30 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 30 мг



Действующее вещество

Амброксол

Состав

1 таб. амброксола гидрохлорид 30 мг. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактоза, магния стеарат, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием вязкой мокроты: — острый и хронический бронхит — пневмония — бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты — бронхоэктатическая болезнь — ХОБЛ.

Противопоказания

— I триместр беременности — детский возраст до 12 лет (только для таблеток). Детям младше 12 лет назначают Бронхорус . в форме сиропа — повышенная чувствительность к компонентам препарата. В случае непереносимости лактозы (при синдроме нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточности сахаразы /изомальтазы) следует учитывать, что в состав препарата в форме таблеток входит лактоза. Пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы не должны принимать препарат в форме сиропа (т.к. в состав препарата входит сорбитол). С осторожностью применяют при печеночной недостаточности, почечной недостаточности, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, во II и III триместрах беременности, в период лактации (грудного вскармливания).

Применение при беременности и кормлении грудью

При необходимости применения препарата во II и III триместрах беременности следует оценить потенциальную пользу терапии для матери и возможный риск для плода. В период грудного вскармливания применять препарат следует с осторожностью, поскольку амброксол выделяется с грудным молоком.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - диарея, сухость во рту, запор . при длительном применении в высоких дозах - гастралгия, тошнота, рвота. Со стороны дыхательной системы: сухость слизистых оболочек дыхательных путей, ринорея. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек . в отдельных случаях - аллергический дерматит, анафилактический шок. Прочие: редко - общая слабость, головная боль, экзантема, дизурия.

Особые указания

Со стороны пищеварительной системы: редко - диарея, сухость во рту, запор . при длительном применении в высоких дозах - гастралгия, тошнота, рвота. Со стороны дыхательной системы: сухость слизистых оболочек дыхательных путей, ринорея. Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек . в отдельных случаях - аллергический дерматит, анафилактический шок. Прочие: редко - общая слабость, головная боль, экзантема, дизурия.