Инструкция по применению
Бронхорус таблетки 30 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Синтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 30 мг

Описание

Круглые таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.

Действующее вещество

Амброксол

Состав

Состав на одну таблетку: Активное вещество: амброксола гидрохлорид - 30 мг. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактоза (сахар молочный), магния стеарат, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция - высокая (при любых путях введения), время достижения максимальной концентрации -2 ч, связь с белками плазмы - 80%. Проникает через гематоэнцефалический барьер, плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Метаболизм - в печени, образует дибромантраниловую кислоту и глюкуроновые конъюгаты. Период полувыведения - 7-12 ч. Выводится почками: 90% в виде водорастворимых метаболитов, в неизмененном виде - 5%. Период полувыведения увеличивается при тяжелой хронической почечной недостаточности, не изменяется при нарушении функции печени.

Показания

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся выделением вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с затрудненным отхождением мокроты, бронхоэктатическая болезнь.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды, запивая большим количеством жидкости. Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке (30 мг) 3 раза в сутки. При необходимости для усиления терапевтического эффекта можно назначать по 2 таблетки (60 мг) 2 раза в сутки. В тяжелых случаях заболевания дозу не уменьшают в течение всего курса лечения. Детям младше 12 лет Бронхорус назначают в форме сиропа. Не рекомендуется принимать препарат более 5 дней без консультации врача.

Противопоказания

Гиперчувствительность, беременность (I триместр), возраст до 12 лет (детям младше 12 лет назначают Бронхорус в форме сиропа). В случае непереносимости лактозы (при синдроме нарушения всасывания глюкозы/галактозы или недостаточности сахарозы/изомальтозы) следует учитывать, что в состав препарата входит лактоза.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, в отдельных случаях - аллергический контактный дерматит, анафилактический шок. Редко - общая слабость, головная боль, диарея, дизурия, экзантемы, ринорея, запоры. При длительном применении в высоких дозах - гастралгия, тошнота, рвота.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, диспепсия. Лечение: искусственная рвота, промывание желудка в первые 1-2 ч после приема препарата, прием жиросодержащих продуктов.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное применение с противокашлевыми лекарственными средствами приводит к затруднению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля. Увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксициклина.

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.