Инструкция по применению
Бронхостат Таблетки подъязычные 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Мега Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 25 мг

Описание

Таблетки белого, белого с сероватым или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, с риской.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну таблетку): Активные компоненты: Aconitum napellus (Aconitum) (аконит напеллус (аконит)) D12, Bryonia (бриония) D6, Drosera (дрозера) D6, Phosphorus (фосфорус) D6, Gelsemium sempervirens (Gelsemium) (гельземиум семпервиренс (гельземиум)) D6. Вспомогательные компоненты: лактоза моногидрат 0,282 г, крахмал картофельный 0,015 г, кальция стеарат 0,003 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Комплексная терапия острых и хронических бронхитов, синдрома кашля при гриппе, острых респираторных вирусных инфекциях и других инфекционных заболеваниях. Профилактика обострения хронического бронхита.

Способ применения и дозы

Для лечения Стандартная схема: детям с 5 до 10 лет - по 1/2 таблетки 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды; детям старше 10 лет и взрослым - принимать по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывать под языком. При остром состоянии - развести суточную дозу препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке (подержав во рту 10-15 секунд), каждые 10-15 минут в течение 2-3 часов, в дальнейшем перейти на стандартную схему приема. Рекомендуемый курс приема 1-2 месяца. При необходимости можно проводить 3-4 курса в год с интервалом в 1 месяц. Если через 7-10 дней лечения улушения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Для профилактики обострений Детям с 5 до 14 лет - по 1 таблетке в день, детям старше 14 лет и взрослым - по 1 таблетке 2 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды под язык в осенне-зимний период.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Детский возраст до 5 лет. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. До настоящего времени информация о случаях побочных эффектов не поступала.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течении 7-10 дней, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу. Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата соответствует 0,074 хлебной единицы. Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами: Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

от 2# до 25#