
Инструкция по применению
Бронхотон Сироп 125 г

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Болгария
Производитель: Ветпром
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Глауцин+Эфедрин+
[Базилика обыкновенного масло]
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Глауцин+Эфедрин+[Базилика обыкновенного масло]

Состав

Глауцина гидробромид, эфедрина гидрохлорид, масло базилика.

Форма выпуска

Сироп

Показания

Сухой кашель: бронхит, трахеобронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма, коклюш, бронхопневмония.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым - по 1 ст.ложке Бронхотон (15 мл) 3-4 раза в день. Детям старше 3 лет - 1 ч.ложка (5 мл) 3 раза в день, старше 10 лет - 2 ч.ложки 3 раза в день.

Противопоказания

Гиперчувствительность, коронарный атеросклероз, стенокардия, тиреотоксикоз, артериальная гипертензия, бессонница, ХСН, феохромоцитома, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы (в случае наличия остаточной мочи), детский возраст (до 3 лет).С осторожностью. Больным, склонным к развитию лекарственной зависимости.

Побочные действия

Бронхотон снижает гипотензивное действие симпатолитиков.

Передозировка

Повышение АД, тахикардия, тошнота, головокружение.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности