Инструкция по применению
Бронхо-Ваксом взрослый капсулы 7 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Швейцария
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лизаты бактерий [Haemophilus influenzae+Streptococcus pneumoniae+Streptococcus viridans+Streptococcus pyogenes+Klebsiella pneumoniae+Klebsie
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 7 мг
Срок годности: 60

Действующее вещество

Лизаты бактерий [Haemophilus influenzae+Streptococcus pneumoniae+Streptococcus viridans+Streptococcus pyogenes+Klebsiella pneumoniae+Klebsie

Состав

В 1 капсуле содержится: стандартизированный лиофилизат бактериальных лизатов: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis 7 мг.Вспомогательные вещества: пропилгаллат безводный (Е310) - 0.084 мг, натрия глютамат - 3.03 мг, маннитол - до получения 40 мг, крахмал прежелатинизированный - 110 мг, магния стеарат - 3 мг, маннитол - до получения 200 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше:— профилактика рецидивирующей инфекции дыхательных путей и обострений хронического бронхита;— лечение острых инфекций дыхательных путей (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Бронхо-Ваксом; взрослый назначают взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше.С целью лечения острых и обострения хронических инфекций дыхательных путей: по 1 капсуле препарата Бронхо-Ваксом; взрослый ежедневно утром натощак до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. При необходимости проведения антибиотикотерапии Бронхо-Ваксом; взрослый следует принимать в сочетании с антибиотиком с начала лечения. Длительность лечения должен определять врач, исходя из состояния здоровья пациента. С целью профилактики обострений и поддерживающей терапии: 1 капсула препарата Бронхо-Ваксом; взрослый ежедневно утром натощак. Курс включает 3 цикла, каждый из которых состоит из ежедневного приема 1 капсулы в течение 10 дней, интервал между циклами 20 дней. В случае если капсулу трудно проглотить, ее следует открыть и смешать содержимое с питьем (вода, фруктовый сок, молоко).

Противопоказания

Беременность; период лактации; повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

В экспериментальных исследованиях на животных не выявлено отрицательного воздействия на течение беременности, но в связи с тем, что данные о применении препарата у беременных и кормящих женщин отсутствуют, противопоказано его применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Бронхо-Ваксом; взрослый обычно хорошо переносится. Большинство побочных реакций отнесены к общей категории со средней или умеренно выраженной степенью проявления. Наиболее частыми проявлениями побочного действия препарата являются кожные реакции, нарушения со стороны пищеварительного тракта и органов дыхания.В каждой частной категории побочные эффекты сгруппированы по системно-органному классу и представлены в порядке убывания частоты: очень часто (≥1/10); часто (от 1/100 до 1/10); нечасто (от 1/1000 до 1 /100); редко (от 1/10 000 до 1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (на основании имеющихся данных оценку провести невозможно).Со стороны пищеварительной системы: часто - диарея, боль в животе; неизвестно - рвота, тошнота. Со стороны нервной системы: неизвестно - головная боль.Со стороны дыхательной системы: часто - кашель.Дерматологические реакции: часто - сыпь.Аллергические реакции: нечасто - реакции гиперчувствительности (сыпь эритематозная, сыпь генерализованная, эритема, отек век, отек лица, периферические отеки, припухлость лица, зуд, генерализованный зуд, одышка); неизвестно - крапивница, отек Квинке. Прочие: неизвестно - лихорадка, утомляемость.

Передозировка

Сведения о случаях передозировки отсутствуют. Природа препарата Бронхо-Ваксом; взрослый и результаты изучения его токсичности указывают на то, что передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Бронхо-Ваксом; взрослый можно применять одновременно с другими лекарственными препаратами для терапии острых и хронических респираторных заболеваний.Взаимодействие препарата Бронхо-Ваксом; взрослый с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не установлено.

Особые указания

Компоненты препарата могут вызвать реакции гиперчувствительности. В случае сохраняющихся желудочно-кишечных расстройств, кожной реакции, нарушений со стороны органов дыхания или других симптомов непереносимости препарата, лечение следует прекратить, т.к. данные симптомы являются проявлением аллергической реакции.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:Бронхо-Ваксом; взрослый не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей