Инструкция по применению
Бупивакаин Гринд.Спинал раствор 5мг/мл 4мл N5

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Латвия
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бупивакаин
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 5 мг/мл

Действующее вещество

Бупивакаин

Состав

Раствор для инъекций 1 мл, бупивакаина гидрохлорид 5 мг.

Форма выпуска

Раствор

Способ применения и дозы

Спинномозговая анестезия в хирургии (для оперативных вмешательств в урологии или нижнеторакальной хирургии длительностью до 3-5 чв абдоминальной хирургии - длительностью 45-60 мин). Блокады тройничного нерва, крестцового, плечевого сплетений, срамного нерва, межреберная, каудальная анестезия и эпидуральная анестезия при кесаревом сечении. Анестезия при вправлении вывихов суставов верхних и нижних конечностей.

Противопоказания

Доза зависит от вида обезболивания. Для обезболивания в хирургии (диагностические и лечебные манипуляции) применяют 2.5-100 мг. Для проведения блокады тройничного нерва - 2.5-12.5 мг . звездчатого узла - 25-50 мг . крестцового, плечевого сплетения - 75-150 мг . межреберной блокады - 10-25 мг . блокады периферических нервов - 25-150 мг. Для проведения длительной эпидуральной спинномозговой анестезии начальная доза - 50 мг, поддерживающая - 15-25-40 мг каждые 4-6 ч. При проведении эпидуральной и каудальной анестезии в акушерской практике доза составляет 15-50 мг. Эпидуральная анестезия при кесаревом сечении - 75-150 мг. При блокаде срамного нерва - 12.5-25 мг с каждой стороны. Максимальная доза составляет 2 мг/кг.

Применение при беременности и кормлении грудью

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: онемение языка, головокружение, нечеткость зрения, мышечный тремор, сонливость, судороги, потеря сознания. В области анестезии возможны парестезии, ослабление тонуса сфинктеров. Со стороны сердечно-сосудистой системы: уменьшение сердечного выброса, блокады сердца, артериальная гипотензия, брадикардия, желудочковые аритмии, остановка сердца. Со стороны дыхательной системы: апноэ. Аллергические реакции: кожные проявления, в тяжелых случаях - анафилактический шок. Побочные эффекты наблюдаются редко, вероятность их развития повышается при применении неадекватной дозы и нарушении техники введения бупивакаина.

Побочные действия

Меры предосторожности

Особые указания

Меры предосторожности