# Инструкция по применению
# Бутадион-Озон Мазь 5 % 20 г

## Характеристики




Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенилбутазон
Количество в упаковке: 1

## Описание

Белая однородная мазь со специфическим запахом.

## Действующее вещество

Фенилбутазон

## Состав

Активное вещество: фенилбутазон - 5,0 г, Вспомогательные вещества: глицерол - 7,0 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) - 30,0 г, пропиленгликоль - 12,0 г, кремния диоксид коллоидный - 4,3 г, полисорбат-60 - 5,0 г, кармеллоза натрия - 0,5 г, метилпарагидроксибензоат - 0,2 г, вода - 36,0 г.

## Форма выпуска

Мазь

## Фармакокинетика

При аппликации системная абсорбция составляет не более 5%. Фенилбутазон подвергается метаболизму в печени, выделяется в форме метаболитов в основном почками и около 1/4 через кишечник. Время элиминации из плазмы крови длительное (в среднем 70 ч, у лиц пожилого возраста до 105 ч).

**Показания**

Посттравматическое воспаление мягких тканей и суставов, например, в результате повреждений связочного аппарата и ушибов. Ревматические заболевания мягких тканей (тендовагинит, бурсит, поражение периартикулярных тканей). Мышечные боли ревматического и неревматического происхождения.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Взрослые и дети старше 14 лет: препарат наносят тонким слоем, полоска 2-3 см над очагом воспаления без втирания 2-3 раза в сутки. Курс лечения 7-10 дней. После 10 дней применения необходимо проконсультироваться с врачом.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к фенилбутазону или другим компонентам препарата, к ацетилсалициловой кислоте или другим нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Анамнестические данные о приступе бронхообструкции, аллергического ринита, крапивницы после приема ацетилсалициловой кислоты или другого НПВП. Беременность (I и III триместр), период грудного вскармливания. Нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения. Детский возраст до 14 лет. Совместное применение с другими препаратами, содержащими фенилбутазон. С осторожностью: эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, бронхиальная астма, тяжелые нарушения функции печени или почек, нарушение свертываемости крови, детский возраст с 15 лет, беременность II триместр.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат противопоказан в I и III триместре беременности из-за возможности нарушений развития плода. Во II триместре беременности Бутадион применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

**Побочные действия**

Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, шелушение). Аллергические реакции: крапивница, ангионевротический отек, бронхоспазм, генерализованная кожная сыпь.

**Передозировка**

Крайне низкая абсорбция активных компонентов препарата при наружном применении делает передозировку практически невозможной. При случайном проглатывании больших количеств мази (более 20 г) возможно появление системных нежелательных реакций, характерных для НПВП. Лечение: необходимо промывание желудка, прием активированного угля.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано. Следует избегать совместного применения Бутадиона с другими нестероидными противовоспалительными препаратами. Препарат может усиливать действие препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию.

**Особые указания**

При появлении покраснения кожи терапию следует прекратить. Мазь следует наносить только на неповрежденную кожу, избегая попадания на открытые раны. После нанесения не следует накладывать окклюзионную повязку. Не следует допускать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. Препарат не следует применять для лечения тромбофлебита глубоких вен конечностей. Для предупреждения фотосенсибилизации следует защищать кожу от попадания прямых солнечных лучей. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Нет информации о влиянии Бутадиона на способность управлять автомобилем и на занятия другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.