Инструкция по применению
Бутадион-OBL таблетки 150мг N10

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Оболенское ФП
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Фенилбутазон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 150 мг

Действующее вещество

Фенилбутазон

Состав

Фенилбутазон 150 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При приеме внутрь обладает высокой степенью абсорбции, биодоступность составляет 85-90% и снижается при длительном приеме. Cmax достигается через 1-2 ч. Связь с белками плазмы - более 95%. Метаболизируется в печени с образованием двух основных метаболитов. T1/2 – 18-24 ч. Выводится почками 70% (5% в неизмененном виде), 30% - через кишечник в виде метаболитов.

Показания

Для приема внутрь и парентерально: ревматизм, инфекционный неспецифический полиартрит, болезнь Бехтерева, подагрический артрит, псориатический артрит, узловатая эритема, малая хорея.;Для наружного применения: дерматиты, вызванные механическими воздействиями, ожоги I и II степени небольшой площади, солнечные ожоги, укусы насекомых, воспалительные инфильтраты, растяжения мышц и сухожилий.;В качестве вспомогательного средства: ревматический артрит, артроз, синовиты.

Способ применения и дозы

Внутрь применяют по 200-400 мг 3-4 раза/сут. После клинического улучшения дозу постепенно снижают. Парентерально применяют с целью купирования острых проявлений заболеваний в индивидуально подобранных дозах. Наружно применяют 2-3 раза/сут.

Противопоказания

Для приема внутрь и парентерально: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения функции печени и почек, заболевания органов кроветворения, лейкопения, хроническая сердечная недостаточность, аритмии. Беременность. Повышенная чувствительность к производным пиразолона. Для наружного применения: трофические поражения кожи с возникновением язв, экзем; повышенная чувствительность к производным пиразолона.

Применение при беременности и кормлении грудью

Для приема внутрь противопоказанием является беременность.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диспепсия, НПВС-гастропатия, абдоминальные боли, тошнота, рвота, изжога, диарея или запор; при длительном применении в больших дозах - изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, афтозный стоматит, глоссит, эрозивный эзофагит, кровотечение (желудочно-кишечное, десневое, геморроидальное), нарушение функции печени.;Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, сердечная недостаточность, тахикардия.;Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость, депрессия, возбуждение.;Со стороны органов чувств: снижение слуха, шум в ушах.;Со стороны системы кроветворения: агранулоцитоз, лейкопения, анемия, тромбоцитопения.;Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, бронхоспазм, отечный синдром, отек Квинке.;Прочие: усиление потоотделения, маточные кровотечения.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с антикоагулянтами усиливается их антикоагулянтное действие.;При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами возможно нарушение абсорбции фенилбутазона.;При одновременном применении с ацетилсалициловой кислотой уменьшается ее урикозурическое действие.;При одновременном применении с метилфенидатом повышается концентрация фенилбутазона в плазме крови.;Описаны случаи повышения концентрации фенитоина в плазме крови с развитием токсических реакций при его одновременном применении с фенилбутазоном.;При одновременном применении с фенобарбиталом наблюдается небольшое уменьшение концентрации фенилбутазона в плазме крови.

Особые указания

При системном применении фенилбутазона, а также при длительном применении мази на мокнущей, лишенной эпителия коже, необходим систематический контроль картины крови.;Раствор для инъекций содержит лидокаин.;Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Во время лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.