Инструкция по применению
Цефамадар Таблетки гомеопатические 100 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Цефак КГ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки белого цвета без запаха.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

В 1 таблетке содержится: Действующее вещество: Calotropis gigantea (Madar) D4 - 250,0 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 9,00 мг, магния стеарат - 1,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа не позволяет оценивать содержание действующего вещества препарата Цефамадар в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата.

Показания

Избыточная масса тела (ожирение, лишний вес) (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, перед едой. Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке 3 раза в день. Детям от 6 до 12 лет назначают по 1 таблетке 2 раза в день. Рекомендуемая длительность применения препарата Цефамадар составляет 1 месяц. В случае необходимости продолжения курса лечения дальнейшее применение препарата должно контролироваться врачом. Поскольку избыточность массы тела для каждого пациента является индивидуальным параметром и требует разного времени лечения, длительность приема препарата Цефамадар определяется врачом индивидуально.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность и период грудного вскармливания (в связи с отсутствием специальных исследований), детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания (опыт клинического применения препарата у данной категории пациентов отсутствует).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, тошнота, диарея, головокружение, головная боль. В случае возникновения побочных эффектов при применении препарата следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами

Особые указания

Перед началом применения лекарственного средства необходимо убедиться, что причиной ожирения не является какое-либо заболевание и проконсультироваться с врачом. В начале применения гомеопатического лекарственного средства может наблюдаться временное ухудшение текущего состояния пациентов. В таких случаях следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Не следует превышать рекомендованные дозы и длительность применения при самостоятельном применении препарата. В случае отсутствия улучшений или при утяжелении симптомов следует обратиться к врачу. Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами, а также не отменяет другие меры, назначенные врачом (такие как лечебная физкультура и/или изменение пищевых привычек).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внилания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами), т.к. он может вызывать головокружение.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.