Инструкция по применению
Цель т Мазь гомеопатическая 100 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в терапии гонартрозах, спондилоартрозов, плечелопаточных периартритов.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 100 г препарата): Активные компоненты: Cartilago suis (Картиляго суис) D2 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis (Фуникулюс умбиликалис суис) D2 0,001 г, Embryo totalis suis (Эмбрио тоталис суис) D2 0,001 г, Placenta totalis suis (Плацента тоталис суис) D2 0,001 г, Rhus toxicodendron (Рус токсикодендрон) D2 0,27 г, Arnica montana (Арника монтана) D2 0,3 г, Solanum dulcamara (Солянум дулькамара) D2 0,075 г, Symphytum officinale (Симфитум оффицинале) D8 0,75 г, Sanguinaria canadensis (Сангвинариа канаденсис) D2 0,225 г, Sulfur (Сульфур) D6 0,27 г, Nadidum (Надидум) D6 0,01 г, Coenzym A (Коэнзим А) D6 0,01 г, Acidum DL-#-liponicum (Ацидум DL-#-липоникум) D6 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum (Натриум диэтилоксалацетикум) D6 0,01 г, Acidum silicicum (Ацидум силицикум) D6 1 г, Вспомогательные вещества: парафин жидкий 9,342 г, цетостеариловый спирт (тип А) эмульгирующий 8,007 г, парафин белый мягкий 9,342 г, вода очищенная 60,810 г, этанол (спирт этиловый) 96 % (по объёму) 9,565 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз, плечелопаточный периартрит.

Способ применения и дозы

Если не прописано иначе, взрослым и детям старше 12 лет нанести 4-5 см мази на кожу в области болезненных суставов и втирать легкими движениями 2-3 раза в день. Возможно наложение марлевой повязки. Курс лечения при артрозах - 5-10 недель, при спондилоартрозе и плече лопаточном периатрите - около 4 недель.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к Токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные. Заболевания кожи, нарушения целостности кожных покровов в местах нанесения мази. Повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту. Возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и глубокие раны. Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение и других лекарственных форм препарата (раствора для внутримышечного введения Цель® Т, таблеток для рассасывания Цель® Т), а также препарата Траумель® С. Тубу следует закрывать сразу после применения препарата.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте! 3 года. Не применять по истечении срока годности.