Инструкция по применению
Цель Т Раствор для внутримышечного введения ампулы 2,2 мл 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Арнебия
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 2,2 мл
Срок годности: 60

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 амп.: Cartilago suis (картиляго суис) D6 2.2 мгFuniculus umbilicalis suis (фуникулюс умбиликалис суис) D6 2.2 мгEmbryo totalis suis (эмбрио тоталис суис) D6 2.2 мгPlacenta totalis suis (плацента тоталис суис) D6 2.2 мгSolanum dulcamara (Dulcamara) (соланум дулькамара (дулькамара)) D3 11 мгSymphytum officinale (Symphytum) (симфитум оффицинале (симфитум)) D6 11 мгNadidum (надидум) D8 2.2 мгCoenzym A (коэнзим А) D8 2.2 мгSanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинариа канаденсис (сангвинариа)) D4 3.3 мгNatrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (натриум диэтилоксалацетикум (натриумдиэтилоксалацетат)) D8 2.2 мгAcidum DL-α-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (ацидум DL-α-липоникум (ацидум α-липоникум)) D8 2.2 мгToxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (токсикодендрон кверцифолиум (рус токсикодендрон)) D2 11 мгArnica montana (Arnica) (арника монтана (арника)) D4 220 мгSulfur (сульфур) D6 3.96 мг

Форма выпуска

Раствор

Показания

В комплексной терапии артрозов различной этиологии, спондилоартрозов и плечелопаточных периартритов.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, вводить внутримышечно по 2.2 мл (содержимое 1 ампулы) 2 раза в неделю. Доза, кратность приема и длительность курса лечения назначается врачом. Средний курс лечения составляет 4-5 недель. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Противопоказания

возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных; повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, особенно к токсикодендрону дуболистному и к растениям семейства астровых. С осторожностью: заболевания печени, при единовременном приеме гепатотоксичных веществ.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В случаях непереносимости токсикодендрона дуболистного (Rhus toxicodendron) и растения семейства астровых (например, арника) крайне редко может развиться реакция, сопровождающаяся повышением температуры, покраснением, болью в месте введения инъекции. Для лекарственных средств и рецептур, содержащих сангвипарию, в литературе описаны единичные случаи повышения в крови активности печеночных ферментов (трансаминаз) и значений билирубина. В очень редких случаях желудочно-кишечные расстройства. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Не влияет.

Условия хранения

В сухом месте