Инструкция по применению
Цель Т Раствор для инъекций Ампулы 2,2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 2,2 мл
Срок годности: 60

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в трерапии гонартрозах, спондилоартрозов, плечелопаточных периартритов.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)): Активные компоненты: Cartilago suis (Картиляго суис) D6 2,2 мг, Funiculus umbilicalis suis (Фуникулюс умбиликалис суис) D6 2,2 мг, Embryo totalis suis (Эмбрио тоталис суис) D6 2,2 мг, Placenta totalis suis (Плацента тоталис суис) D6 2,2 мг, Solanum dulcamara (Dulcamara) (Соланум дулькамара (Дулькамара)) D3 11,0 мг, Symphytum officinale (Symphytum) (Симфитум официнале (Симфитум)) D6 11,0 мг, Nadidum (Надидум) D8 2,2 мг, Coenzym A (Коэнзим А) D8 2,2 мг, Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (Сангвинария канаденсис (Сангвинариа)) D4 3,3 мг, Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (Натриум диэтилоксалацетикум (Натриумдиэтилоксалацетат)) D8 2,2 мг, Acidum DL-#-liponicum (Acidum # -liponicum) (Ацидум DL-#-липоникум (Ацидум #-липоникум)) D8 2,2 мг, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (Токсикодендрон кверцифолиум (Рус токсикодендрон)) D2 11,0 мг, Arnica montana (Arnica) (Арника монтана (Арника)) D4 220,0 мг, Sulfur (Сульфур) D6 3,96 мг, Вспомогательные вещества: натрия хлорид для установления изотонии около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В комплексной терапии артрозов различной этиологии, спондилоартрозов и плечелопаточных периартритов.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, вводить внутримышечно по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) 2 раза в неделю. Доза, кратность приема и длительность курса лечения назначается врачом. Средний курс лечения составляет 4-5 недель. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, особенно к токсикодендрону дуболистному и к растениям семейства астровых. Возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных. С осторожностью: заболевания печени, при единовременном приеме гепатотоксичных веществ.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В случаях непереносимости токсикодендрона дуболистного (Rhus toxicodendron) и растения семейства астровых (например, арника) крайне редко может развиться реакция, сопровождающаяся повышением температуры, покраснением, болью в месте введения инъекции. Для лекарственных средств и рецептур, содержащих сангвинарию, в литературе описаны единичные случаи повышения в крови активности «печеночных» ферментов (трансаминаз) и значений билирубина. В очень редких случаях желудочно-кишечные расстройства. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.

Условия хранения

В сухом темном месте