**Инструкция по применению**
**Цель Т Таблетки для рассасывания 50 шт**

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50




## Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в терапии гонартрозах, спондилоартрозов, плечелопаточных периартритов.

## Действующее вещество

Гомеопатический состав

## Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Cartilago suis (Картиляго суис) D4 0,3 мг, Funiculus umbilicalis suis (Фуникулюс умбиликалис суис) D4 0,3 мг, Embryo totalis suis (Эмбрио тоталис суис) D4 0,3 мг, Placenta totalis suis (Плацента тоталис суис) D4 0,3 мг, Toxicodendron quercifolium (Токсикодендрон кверцифолиум) D2 0,54 мг, Arnica montana (Арника монтана) D1 0,6 мг, Solanum dulcamara (Солянум дулькамара) D2 0,15 мг, Symphytum officinale (Симфитум оффицинале) D8 0,15 мг, Sanguinaria canadensis (Сангвинариа канаденсис) D3 0,45 мг, Sulfur (Сульфур) D6 0,54 мг, Nadidum (Надидум) D6 0,03 мг, Coenzym A (Коэнзим А) D6 0,03 мг, Natrium diethyloxalaceticum (Натриум диэтилоксалацетикум) D6 0,03 мг, Acidum silicicum (Ацидум силицикум) D6 3,0 мг, Acidum DL-#-liponicum (Ацидум DL-#-липоникум) D6 0,03 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

**Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания

**Показания**

Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз, плечелопаточный периартрит

**Способ применения и дозы**

По 1 таблетке 3 раза в день, таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс лечения: при артрозах и гонартрозах - 5-10 недель, при спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите - около 4 недель.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к Токсикодендрону дуболистному и растениям семейства сложноцветные. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции. В связи с наличием Токсикодендрона дуболистного могут наблюдаться желудочно-кишечные жалобы (тошнота, умеренная абдоминальная боль) или кожные реакции (зуд, припухлость, лицевая гипестезия, сыпь) даже спустя несколько дней после приема препарата. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

**Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания**

В зависимости от тяжести заболевания, по согласованию с врачом, возможно включение в схему лечения других лекарственных форм препарата, а также препарата Траумель® С. При приеме гомеопатических лекарственных препаратов могут временно обостряться симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следуем прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. Пенал закрывать сразу после применения препарата.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте! 5 лет. Не применять по истечении срока годности.