
Инструкция по применению
Целестодерм-В Мазь для наружного применения 0,1 % 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Германия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бетаметазон
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0,1%
Срок годности: 36



Описание

Глюкокортикостероид для местного применения.

Действующее вещество

Бетаметазон

Состав

В 1 г мази содержится: #### Активное вещество: бетаметазона 17-валерат – 1,22 мг (в эквиваленте 1 мг бетаметазона), #### Вспомогательные вещества: * парафин жидкий – 100,0 мг, * парафин белый мягкий – 898,78 мг.

Форма выпуска

Мазь

Показания

* Воспалительные заболевания кожи, * поддающиеся глюкокортикостероидной (ГКС) терапии, * экзема (атопическая, детская, монетовидная), * контактный дерматит, * себорейный дерматит, * нейродермит, * солнечный дерматит, * эксфолиативный дерматит, * лучевой дерматит, * интертригинозный дерматит, * псориаз, * аногенитальный и старческий зуд.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь Целестодерм-В следует наносить тонким слоем на пораженные участки 1-3 раза в день, в зависимости от тяжести состояния. В большинстве случаев для достижения эффекта бывает достаточным нанесение 1-2 раза в день.

Противопоказания

* Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата. * Беременность (применение высоких доз, длительное лечение). * Период лактации. * Детский возраст – до 6 месяцев.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с тем, что безопасность применения местных ГКС у беременных не установлена, назначение препаратов этого класса в период беременности оправдано только, если польза для матери явно превышает возможный вред для плода. Препараты данной группы не должны применяться у беременных в больших дозах или в течение длительного времени. Так как до настоящего времени не установлено, могут ли ГКС при местном применении и системной абсорбции проникать в грудное молоко, следует прекратить грудное вскармливание или применение препарата, учитывая, насколько его применение необходимо для матери.

Побочные действия

При применении ГКС местного действия наблюдались следующие нежелательные явления: * жжение, * раздражение и сухость кожи, * фолликулит, * гипертрихоз, * угревидные высыпания, * гипопигментация, * периоральный дерматит, * аллергический контактный дерматит, * мацерация кожи, * вторичная инфекция, * атрофия кожи, * стрии и потница.

Передозировка

Симптомы. Чрезмерное или длительное применение местных ГКС может вызвать угнетение функции гипофизарно-надпочечниковой системы, что может стать причиной развития вторичной недостаточности коры надпочечников и появления симптомов гиперкортицизма, включая синдром Кушинга. #### Лечение. Показано соответствующее симптоматическое лечение. Острые симптомы гиперкортицизма обычно обратимы. При необходимости показана коррекция электролитного дисбаланса. В случае хронического токсического действия рекомендуется постепенная отмена ГКС.

Взаимодействие с другими препаратами

Какого-либо взаимодействия препарата Целестодерм-В с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.

Особые указания

При отсутствии эффекта от лечения в течение 2 недель рекомендуется обратиться к лечащему врачу с целью возможного уточнения диагноза. Если при применении препарата отмечено раздражение или реакция повышенной чувствительности, лечение следует прекратить и подобрать больному адекватную терапию. При вторичной грибковой или бактериальной инфекции следует назначить соответствующие лекарственные средства. В случае отсутствия при этом быстрого положительного эффекта, применение ГКС должно быть прекращено до тех пор, пока не будут ликвидированы все признаки инфекции. Любые побочные эффекты системных ГКС, в том числе угнетение функции коры надпочечников, могут отмечаться также при использовании местных ГКС, особенно у детей. Системная абсорбция местных ГКС повышена при их длительном применении, при лечении обширных поверхностей тела или при использовании закрывающих повязок, а также у детей. Целестодерм-В показан только для наружного применения и не предназначен для применения в офтальмологии.

Условия хранения

При комнатной температуре