Инструкция по применению
Целлекс Раствор для подкожного введения 0,1 мг/мл Ампулы 1 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: ДЕКО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Целлекс
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 0.1 мг/мл
Срок годности: 12.0

Действующее вещество

Целлекс

Состав

Состав на 1 мл: Активное вещество: целлекс субстанция-раствор (замороженный в пересчете на белок* 0,100 мг Вспомогательное вещество: Глицина - 3,75мг Натрия гидрофосфата дигидрат - 2,99 мг Натрия дигидрофосфата моногидрат - 0,47мг Натрия хлорида - 5,85 мг Воды для инъекций до 1,0 мл

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Сложный состав Целлекса®, активная фракция которого состоит из сбалансированной и стабильной смеси биологически активных белков и полипептидов, обладающих суммарным полифункциональным действием, не позволяет провести обычный фармакокинетический анализ отдельных компонентов.

Показания

Острые нарушения мозгового кровообращения в остром и раннем реабилитационном периоде течения заболевания в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат назначают в дозе 0,1 - 0,2 мг 1 раз в сутки подкожно в течение 10 дней в зависимости от тяжести состояния больного. При необходимости проводят повторный курс через 10 дней. Исследования по применению препарата в детской практике не проводились. Правила введения раствора: Препарат вводится подкожно через стерильный шприцевый фильтр, входящий в комплект. Для введения набирают необходимое количество Целлекса® в шприц, снимают иглу, затем надевают на шприц стерильный шприцевый фильтр с диаметром пор 0,22 мкм. Берут новую иглу и надевают ее на стерильный шприцевый фильтр. Препарат готов к применению.

Противопоказания

Эпилепсия, маниакальный психоз, продуктивный бред, делирий, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

Отсутствие соответствующих исследований не позволяет применять препарат у данного контингента больных.

Побочные действия

Могут отмечаться аллергические реакции в виде невыраженной гиперемии в месте введения, реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек), субфебрилитет, нарушение сна, головная боль.

Взаимодействие с другими препаратами

Могут отмечаться аллергические реакции в виде невыраженной гиперемии в месте введения, реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек), субфебрилитет, нарушение сна, головная боль.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении