Инструкция по применению
Церегамон таблетки 50 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Марбиофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Никотиноил гамма-аминомасляная кислота

Состав

Действующее вещество: никотиноил гамма-аминомасляная кислота – 0,05 г (N-никотиноил-гамма-аминомасляной кислоты натриевая соль). Вспомогательные вещества: лудипресс [состоящий из лактозы моногидрата от 91,0 до 95,0%, повидона (коллидона 30) от 3,0% до 4,0%, кросповидона (коллидона-CL) от 3,0 до 4,0%)] – 0,195 г, кальция стеарата моногидрат – 0,0025 г, тальк – 0,0025 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция – быстрая и полная. Проникает через гематоэнцефалический барьер, длительно удерживается в тканях организма. Биодоступность – 50-88%. Выводится, в основном, почками в неизмененном виде. Период полувыведения (T1/2) – 0,51 ч.

Показания

В составе комплексной терапии – цереброваскулярная недостаточность, астения, депрессивные расстройства в пожилом возрасте. Состояния, сопровождающиеся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью. Астенические состояния, обусловленные различными нервно-психическими заболеваниями. В составе комплексной терапии при алкоголизме – для уменьшения астенических, астеноневротических, постпсихотических, предрецидивных состояний, а также алкогольной энцефалопатии. В составе комплексной терапии – мигрень (профилактика), черепно-мозговая травма, нейроинфекция. Улучшение переносимости физических и умственных нагрузок (лицам, находящимся в напряженных и экстремальных условиях деятельности, для восстановления физической работоспособности спортсменов, для повышения устойчивости к физическим и умственным нагрузкам). В урологической практике (у детей старше 3 лет и у взрослых с расстройствами мочеиспускания) для улучшения адаптационной функции мочевого пузыря (снижение гипоксии детрузора).

Способ применения и дозы

Внутрь, независимо от приема пищи. При цереброваскулярных заболеваниях разовая доза 25-50 мг 2-3 раза в сутки, суточная доза – 50-150 мг. Курс лечения – 1-2 мес. Повторный курс – через 5-6 мес. Депрессивные состояния позднего возраста – 50-200 мг/сут за 2-3 приема, оптимальная доза – 50-125 мг/сут, в течение 1,5-3 мес. В качестве антиастенического и анксиолитического средства – по 50-75 мг/сут, при необходимости – до 200-300 мг/сут в течение 1-1,5 мес. Для профилактики приступов мигрени – по 50 мг 3 раза в день, для купирования приступа – 100 мг однократно. При алкоголизме в период абстиненции – 100-150 мг/сут, коротким курсом 6-7 дней, при более стойких нарушениях вне абстиненции – суточная доза 50 мг в течение 4-5 недель. Для восстановления работоспособности и при повышенных нагрузках – 50-75 мг/сут в течение 1-1,5 мес, для спортсменов в той же дозе, в течение 2-х недель тренировочного периода. При расстройствах мочеиспускания: 25 мг 2-3 раза в день (дл детей от 3 до 10 лет), 50 мг 2 раза в день (для детей от 11 до 15 лет), 50 мг 3 раза в день (для пациентов старше 15 лет). Курс лечения 1 месяц.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, хроническая почечная недостаточность, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дети до 3 лет. Препарат противопоказан у детей по всем показаниям, кроме расстройств мочеиспускания, при котором он применяется с 3-х лет. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания препарат принимать не рекомендуется, так как исследования по влиянию на беременность и проникновение в грудное молоко не проводились.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), головокружение, головная боль, легкая тошнота, раздражительность, тревога, ажитация. При появлении вышеперечисленных признаков немедленно обратитесь к врачу. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое

Взаимодействие с другими препаратами

Укорачивает время действия барбитуратов, усиливает действие опиоидных анальгетиков.

Особые указания

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с движущимися механизмами.

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.