**Инструкция по применению**
**Церепро Капсулы 400 мг 28 шт**

### Характеристики




Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Холина альфосцерат
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 400 мг

### Описание

Капсулы Церепро являются ноотропным препаратом. Препарат улучшает функции мозга, воздействуя на патогенетические факторы инволюционного психоорганического синдрома, изменяет фосфолипидный состав мембран нейронов и снижает холинергическую активность.

### Действующее вещество

Холина альфосцерат

### Состав

Холина альфосцерат (глицерилфосфорилхолина гидрат) 400 мг, глицерол (глицерин), вода очищенная.Состав оболочки капсулы: желатин медицинский, глицерол (глицерин), метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), краситель оксид железа красный, диоксид титана, вода очищенная, сорбитол (сорбит).

### Форма выпуска

Капсулы

**Фармакокинетика**

После приема внутрь абсорбция составляет 88%.Легко проникает через ГЭБ, концентрация в головном мозге достигает 45% уровня в плазме крови.В организме холина альфосцерат под действием ферментов биотрансформируется до холина и глицерофосфата (обеспечивающих фармакологические эффекты препарата). 85% выводится легкими в виде диоксида углерода, оставшаяся часть (15%) выводится с мочой и калом.

**Показания**

— острый и восстановительный периоды тяжелой черепно-мозговой травмы и ишемического инсульта, восстановительный период геморрагического инсульта, протекающие с очаговой полушарной симптоматикой или симптомами поражения ствола мозга,— психоорганический синдром на фоне дегенеративных и инволюционных изменений мозга,— хроническая недостаточность мозгового кровообращения,— когнитивные расстройства (нарушения мыслительной функции, памяти, спутанность сознания, дезориентация, снижение мотивации, инициативности и способности к концентрации внимания), в т.ч. при деменции и энцефалопатии,— старческая псевдомеланхолия.

**Способ применения и дозы**

При острых состояниях препарат вводят в/м или в/в (медленно) в суточной дозе 1 г (1 ампула) на протяжении 10-15 дней, затем переходят на пероральный прием препарата в суточной дозе 1.2 г (по 800 мг /2 капс./ утром и 400 мг /1 капс./ днем) в течение 6 мес.При хронических состояниях препарат назначают внутрь по 400 мг (1 капс.) 3 раза/сут. Продолжительность терапии - 3-6 мес.Капсулы рекомендуют принимать до еды.

**Противопоказания**

— беременность,— период лактации (грудного вскармливания),— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).В экспериментальных исследованиях не выявлено мутагенного и тератогенного действия препарата, а также влияния на репродуктивные функции.

**Побочные действия**

Со стороны пищеварительной системы: тошнота (как следствие допаминергической активации).Прочие: аллергические реакции.

**Передозировка**

Симптомы: диспепсия.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

**Особые указания**

При возникновении тошноты после приема препарата следует уменьшить дозу. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиЦерепро не оказывает влияния на быстроту психомоторных реакций.