Инструкция по применению
Церепро капсулы 400мг N14

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Верофарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Холина альфосцерат
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 400 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Холина альфосцерат

Состав

Действующее вещество: Холина альфосцерат (Choline alfoscerate)Концентрация действующего вещества (мг): 400

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределениеПосле приема внутрь абсорбция составляет 88%.Легко проникает через ГЭБ, концентрация в головном мозге достигает 45% уровня в плазме крови.Метаболизм и выведениеВ организме холина альфосцерат под действием ферментов биотрансформируется до холина и глицерофосфата (обеспечивающих фармакологические эффекты препарата). 85% выводится легкими в виде диоксида углерода; оставшаяся часть (15%) выводится с мочой и калом.

Показания

Острый и восстановительный периоды тяжелой ЧМТ и ишемического инсульта, восстановительный период геморрагического инсульта, протекающие с очаговой полушарной симптоматикой или симптомами поражения ствола мозга; психоорганический синдром на фоне дегенеративных и инволюционных изменений мозга;хроническая недостаточность мозгового кровообращения;когнитивные расстройства (нарушения мыслительной функции, памяти, спутанность сознания, дезориентация, снижение мотивации, инициативности и способности к концентрации внимания), в т.ч. при деменции и энцефалопатии; старческая псевдомеланхолия.

Способ применения и дозы

При острых состояниях препарат вводят в/м или в/в (медленно) в суточной дозе 1 г (1 ампула) на протяжении 10-15 дней, затем переходят на пероральный прием препарата в суточной дозе 1.2 г (по 800 мг /2 капс./ утром и 400 мг /1 капс./ днем) в течение 6 мес.При хронических состояниях: внутрь по 0,4 г (1 капс.) 3 раза в сутки, предпочтительно до еды. Продолжительность лечения составляет 3–6 мес.

Противопоказания

Гиперчувствительность;беременность;грудное вскармливание.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).В экспериментальных исследованиях не выявлено мутагенного и тератогенного действия препарата, а также влияния на репродуктивные функции.

Побочные действия

Аллергические реакции, тошнота (вследствие дофаминергической активации).

Передозировка

Симптомы: диспепсия.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Церепро не установлено.

Особые указания

При возникновении тошноты после приема препарата следует уменьшить дозу. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиЦерепро не оказывает влияния на быстроту психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте