Инструкция по применению
Цернилтон таблетки 200 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Цернелле
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракты пыльцы ржи+Экстракты пыльцы пшеницы+Экстракты пыльцы тимофеевки луговой
Количество в упаковке: 200
Дозировка действующего вещества: 60 мг+ 3 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Экстракты пыльцы ржи+Экстракты пыльцы пшеницы+Экстракты пыльцы тимофеевки луговой

Состав

1 таблетка содержит:Graminex; G60 (водорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений) 60 мг,Graminex; GFX (жирорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений) 3 мг.Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 237.8 мг, кремния диоксид коллоидный - 5.6 мг, магния стеарат - 3.6 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В составе комплексной терапии:— острого простатита;— хронического простатита;— доброкачественной гиперплазии предстательной железы;— доброкачественной гиперплазии предстательной железы в сочетании с простатитом.

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь за 30 мин до приема пищи, запивая небольшим количеством воды.При остром простатите назначают по 4 таб. 3 раза/сут. Продолжительность курса лечения составляет 3 мес.При хроническом простатите назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут. Продолжительность курса лечения - 3-6 мес.При доброкачественной гиперплазии предстательной железы назначают по 2 таб. 3 раза /сут. Продолжительность курса лечения составляет 12 недель, но может быть увеличена до 6 мес.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции.Редко: тошнота.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки препарата Цернилтон; не наблюдались.

Взаимодействие с другими препаратами

Информация о взаимодействии препарата Цернилтон; с другими лекарственными средствами отсутствует.

Особые указания

При хроническом бактериальном простатите применение препарата возможно только в сочетании с антибактериальными препаратами (под контролем врача).

Условия хранения

В сухом темном месте