
Инструкция по применению
Цервикон-Дим Суппозитории вагинальные 100 мг 25 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Ацино Рус
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дииндолилметан
Количество в упаковке: 25
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Описание

Суппозитории вагинальные от светло-розового до желтовато-розового цвета, торпедообразной формы.

Действующее вещество

Дииндолилметан

Состав

Один суппозиторий содержит: действующее вещество: ,дииндолилметан 100 мг, , вспомогательные вещества: ,жир твердый (Витепсол H-15) (1,9795 г), кросповидон (коллидон CL) (0,0200 г), краситель кармин красный, Е 120 (0,0005 г).

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

При интравагинальном применении дииндолилметан обладает высокой местной биодоступностью и при этом практически не попадает в системный кровоток.

Показания

Лечение дисплазии (цервикальной интраэпителиальной неоплазии) шейки матки (независимо от результатов выявления папилломавирусной инфекции методом ПЦР).

Способ применения и дозы

Интравагинально по 100 мг 2 раза в сутки. Длительность курса лечения 3-6 месяцев. Продолжительность лечения определяется динамикой клинико-лабораторных показателей. , Рекомендации по способу введения препарата: , Препарат вводится во влагалище 2 раза в сутки (утром и вечером) по 1 суппозиторию. Непосредственно перед введением необходимо тщательно вымыть руки. Суппозиторий вводят глубоко во влагалище в положении лежа. После введения рекомендуется пользование гигиенической прокладкой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость любого из компонентов препарата. , Период беременности и грудного вскармливания. , Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Препарат обычно хорошо переносится пациентами. В некоторых случаях могут возникать ниже перечисленные, обычно обратимые, нежелательные явления. Нежелательные явления, представленные ниже, перечислены в зависимости от анатомо-физиологической классификации и частоты встречаемости. Частота возникновения побочных эффектов классифицируется ВОЗ и имеет градации: очень часто (⩾1/10), часто (⩾1/100 и &lt,1/10), нечасто (⩾1/1000 и &lt,1/100), редко (⩾1 /10000 и &lt,1/1000), очень редко (&lt,1/10000), не установлено. Нежелательные явления часто (⩾1/100 и &lt,1/10) нечасто (⩾1/1000 и &lt,1/100) Нарушения со стороны иммунной системы крапивница, зуд Нарушения со стороны сердца укорочение атриовентрикулярного проведения Нарушения со стороны сосудов повышение артериального давления Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта диарея Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей петехиальная сыпь на коже, замедление роста волос на голове, теле Нарушения со стороны половых органов и молочной железы дискомфорт, жжение, зуд во влагалище, бели и хлопьевидные выделения из половых путей сухость во влагалище при половом контакте, задержка менструации Лабораторные и инструментальные данные повышение активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы в плазме крови, тромбоцитопения и повышение скорости оседания эритроцитов, бактериурия, лейкоцитурия, протеинурия, кетонурия снижение концентрации креатинина в плазме крови, лейкоцитоз в мазке с шейки матки, дисбиоз влагалища, признаки гипоксии миокарда на электрокардиограмме Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций проявляются или усугубляются, или если Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось. В связи с отсутствием системной фармакокинетики, не ожидается какого-либо взаимодействия с лекарственными средствами системного применения. Препарат не следует применять одновременно с местными препаратами для интравагинального применения, относящимися к группе антисептиков-окислителей (перманганат калия, йод, перекись водорода).

Особые указания

При лечении вагинальных инфекций препарат не следует применять во время менструации, лечение целесообразно начинать после менструации. В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов. Во время лечения рекомендуется пользоваться средствами контрацепции.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 2 °C до 8 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 2 года. По истечении срока годности препарат не использовать.