Инструкция по применению
Чабреца трава 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Растительное сырье
Страна: Россия
Производитель: Фитофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Порошок представляет собой смесь кусочков стеблей, листьев, цветков. Цвет порошка серовато-зеленый или коричневато-зеленый с желтовато-белыми, красно-коричневыми, светло-коричневыми, часто с фиолетовым оттенком, синевато-фиолетовыми, розово-фиолетовыми, зелеными и темно-зелеными вкраплениями. Запах характерный. Вкус водного извлечения горьковато-пряный.

Состав

Чабреца трава.

Форма выпуска

Растительное сырье

Показания

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (трахеит, бронхит, бронхопневмония), местно для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (фарингит, тонзиллит, стоматит, гингивит).

Способ применения и дозы

2 фильтр - пакета (3 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают в течение 15 минут. Содержимое фильтр-пакетов отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Внутрь принимают по 1/2 стакана теплого настоя 2-3 раза в день. Курс лечения - 2-3 недели. Местно для полосканий полости рта и глотки применяют по 1/2-1 стакану теплого настоя 3-4 раза в день. Курс лечения - 2-4 недели. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать. Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем указаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату и другим растениям семейства Яснотковые, при приеме внутрь - нарушения функции печени, почек, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Длительное применение больших доз может вызвать тошноту. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке). Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.