Инструкция по применению
Чага Лекра-СЭТ 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Растительное сырье
Страна: Россия
Производитель: ЛЕКРА-СЭТ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Средство из фитопатогенного гриба инонотуса скошенного (трутовик косотрубчатый, трутовик косой), развивающегося в форме наростов на стволах березы. Основными действующими веществами являются пигменты, образующие хромогенный полифенолкарбоновый комплекс (20%) в сочетании с полисахаридами (6-8%), агариционовой и гуминоподобной чаговыми кислотами. Тонизирующее влияние на ЦНС и иммуномодулирующие свойства обеспечивают повышение устойчивости организма к гипоксии и другим неблагоприятным воздействиям. Наличие меди, марганца, кобальта обеспечивает стимулирующее влияние на кроветворение, особенно на лейкопоэз. Препараты березового гриба обладают гастропротекторным действием, нормализуют функции пищеварительных желез. Повышение функциональной активности иммунной системы, особенно функции естественных клеток-киллеров, определяет, по-видимому, противоопухолевые свойства березового гриба.Сырье растительное измельченное

Состав

Березовый гриб (чага)

Форма выпуска

Растительное сырье

Показания

Биологически активная добавка (БАД) к пище - является источником фенольных соединений, содержащей хромогенный комплекс.Дискинезия ЖКТ по гипотоническому типу, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты, астенические состояния, кахексия, послеоперационный период, длительная иммуносупрессивная терапия.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку (1,5 - 2,0 г) продукта залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настоять 15 минут, процедить, принимать взрослым по 1/4 стакана (50мл) настоя 2 раза в день, или по 1 стакану (200 мл) настоя 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимой прием можно повторить. Готовый настой хранить в холодильник.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 ºС до +25 ºС.