Инструкция по применению
Чага (березовый гриб) чага измельченная 50г

Характеристики



Форма выпуска: Трава измельченная
Страна: Россия
Производитель: Иван-Чай
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Чага (березовый гриб)
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Чага (березовый гриб)

Состав

Чага (березовый гриб) (Inonotus obliquus)

Форма выпуска

Трава измельченная

Показания

В качестве вспомогательного средства в комплексной терапии хронических гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки вне обострения, дискинезии желудочно-кишечного тракта по гипокинетическому типу, а также в качестве симптоматического средства при онкологических заболеваниях, улучшающего общее состояние онкологических больных.

Способ применения и дозы

Содержимое пачки (50 г сырья) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 0,5 л теплой кипяченой воды (не выше 50 °C), настаивают в течении 2 суток при комнатной температуре, процеживают, сырье отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 0,5 л. Принимают внутрь по 1/2 стакана 6 раз в день или по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды. Лечение проводят курсами по 3-5 месяцев с перерывами 7-10 дней. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату; беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При длительном непрерывном применении препарата чаги может наблюдаться повышенная возбудимость, вегетативная лабильность, диспептические явления. В этих случаях следует уменьшить дозу или отменить препарат. Если при применении препарата наблюдаются побочные эффекты или Вы заметили наличие каких-либо нежелательных реакций, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное назначение пенициллинов и внутривенное введение декстрозы.

Особые указания

При лечении препаратом чаги показана молочно-растительная диета, ограничение в рационе питания жиров и мяса, исключение копченостей, острых приправ, консервов. При заболеваниях, сопровождающихся задержкой жидкости в организме, необходимо ограничить употребление воды. Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, работа с движущимися механизмами. Препарат не оказывает влияния на способность к занятию потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Срок хранения после открытия

приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток.

Условия хранения

от 15# до 25#