Инструкция по применению
Чемеричная вода-ТФФ 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Чемерицы Лобеля корневищ с корнями настойка
Количество в упаковке: 1

Описание

Мутная жидкость коричневато-желтого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка.

Действующее вещество

Чемерицы Лобеля корневищ с корнями настойка

Состав

На 100 мл: действующее вещество: чемерицы настойка 50 мл, вспомогательное вещество: вода очищенная 50 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Педикулез волосистой части головы.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед употреблением взбалтывать. Процедуру проводить в резиновых перчатках. Обильно нанести препарат на влажные волосы и кожу волосистой части головы, особое внимание обратить на обработку затылочной области и за ушами. Голову повязать косынкой. Не смывать препарат в течение 20-30 минут. По истечении времени вычешите частым гребнем (расческой) убитых вшей, тщательно вымойте волосы водой и высушите обычным образом. В случае необходимости процедуру можно повторить через 24 часа. В случае вторичного заражения лечение проводят через 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Побочные действия

Аллергические реакции в виде кожного зуда, эритемы, ощущение жжения, покалывания или пощипывания в зоне нанесения препарата.

Передозировка

При случайном приёме препарата внутрь возможно отравление, которое проявляется в виде головокружения, тошноты, рвоты. В течение двух часов необходимо промыть желудок и провести симптоматическое лечение. При случайном приёме внутрь более 100 мл препарата возможен летальный исход.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания препарата на открытые раны, слизистую оболочку глаз, полости носа, ротовой полости. В случае попадания тщательно промыть проточной водой.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующего особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.