Инструкция по применению
Venoteks Trend Чулки компрессионные 1 класс р. M бежевые арт. 1C200

Характеристики

Форма выпуска: Чулки
Страна: Германия
Производитель: ГМБХ Рехард технологии
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 2



Описание

Компрессионные чулки VENOTEKS Trend арт. 1C200 незаменимы при начальных стадиях хронической венозной недостаточности. Снимают усталость и тяжесть в ногах, уменьшают отеки, предотвращают прогрессирование варикозной болезни и развитие ее осложнений.Чулки изготовлены из современных гипоаллергенных и безопасных материалов, имеют привлекательный внешний вид и легкую парфюмированную отдушку. Мягкие, шелковистые, элегантные и удобные в использовании.Чулки имеют 1 класс компрессии: 18-21 мм рт. ст.Преимущества Физиологически распределенная градуированная компрессия: лодыжка 100%, верхняя часть голени 70%, средняя треть бедра 40%, Параметры компрессии медицинских трикотажных изделий заложены в сложной современной технологии их изготовления, Компрессия точно рассчитана, дозирована и измерена в миллиметрах ртутного столба, Гарантированное сохранение компрессионных свойств в течение 6 месяцев ежедневного использования, Производятся из современных, безопасных, гипоаллергенных материалов с применением технологии «LatexFree», обеспечивающих активный воздухо- и влагообмен.

Состав

78% нейлон, 22% эластан.

Форма выпуска

Чулки

Показания

Наследственная предрасположенность к варикозной болезни. Начальная форма хронической венозной недостаточности, когда при отсутствии внешних признаков варикозного расширения вен появляются отеки и тяжесть в ногах к вечеру (след от резинки носков). Синдром «тяжелых ног»: тяжесть, боль, судороги, чувство онемения, «мурашек» и распирания в ногах к вечеру. Ретикулярный варикоз в виде выраженного сосудистого рисунка на коже ног. Наличие телеангиоэктазий (сосудистые «звездочки») на коже ног. Профилактика варикоза и улучшение плацентарного кровообращения у беременных.

Способ применения и дозы

Основные принципы использования: компрессионные изделия можно использовать в стационарных и амбулаторных учреждениях, или дома, размер выбирают по окружности ноги, росту, по таблице размеров, снимать мерки нужно с утра (до появления отеков) или после того, как ноги отдохнули, поставив ногу горизонтально - это можно сделать самому или попросить помощи специалиста, изделие нужно надевать утром, как только будут завершены гигиенические процедуры, и носить весь день, если врач не прописал иначе,Порядок надевания/снятия, правила: перед надеванием компрессионных изделий рекомендуем снять с рук украшения, желательно использовать резиновые перчатки, держите верхнюю часть изделия двумя руками и соберите его складками до пятки, выверните наизнанку, вставьте в изделие большие пальцы и наденьте изделие на стопу, растягивая, расправьте, чтобы изделие было расположено прямо, не сжимало пальцы, слегка растягивая подушечками пальцев, равномерно натяните изделие до необходимого уровня, если изделие слишком растянуто по направлению вверх, спустите его до щиколотки и выровняйте до необходимого уровня, не растягивая снимая, также нужно снять украшения. возьмитесь за верхний край изделия обеими руками и растягивающими движениями стяните его в направлении стопы, аккуратно растягивающими движениями, снимите изделие со стопы и кончиков пальцев, снимая чулок, ни в коем случае не тяните за силиконовую резинку - она может оторваться в месте крепления.Правила по уходу за изделиемМедицинские компрессионные изделия устойчивы к использованию кремов, мазей, однако скопление остатков этих веществ, пыли и эпидермы вызывает износ нитей.Рекомендуем стирать руками каждый день.Компрессионные изделия рекомендуется стирать руками, в мыльной воде, при температуре +40°С, не используя отбеливатели и хлорсодержащие средства.После полоскания в воде слегка выжать руками, не скручивать, не выжимать в центрифуге.Сушить в разложенном виде. Не гладить.

Противопоказания

Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Диабетическая полинейропатия и ангиопатия. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз, воспалительные заболевания артерий, осложненные стенозом артерий, тромбозом или тромбоэмболией) (индекс ABPI > 1.2 или индекс ABPI Трофические язвы не венозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей ног. Септический флебит. Местные кожные заболевания ног. Индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав трикотажа. Размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).