Инструкция по применению
Цикадерма Мазь 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Франция
Производитель: Буарон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Вазелиновый экстракт из смеси трех видов свежих растений Calendula officinalis (календула лекарственная), Hypericum perforatum (зверобой продырявленный), Achillea millefolium (тысячелистник) в соотношении 20:10:10 97 г, Ledum palustre MT (багульник болотный, матричная настойка) 1.5 г, Pulsatilla MT (прострел, матричная настойка) 1.5 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Цикадерма не предоставлены.

Показания

— ожоги 1-2 степени; — поверхностные раны (мелкие порезы, трещины, ссадины); — укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Наружно.Детям в возрасте от 1 года и взрослым следует наносить мазь на предварительно обработанную рану 1-2 раза/сут, в случае необходимости наложить повязку.Длительность применения не должна превышать 7 дней.

Противопоказания

— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; — открытые и инфицированные раны; — мокнущий дерматит; — противопоказано нанесение на слизистые оболочки; — детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Необходимо проконсультироваться с врачом, если после нескольких дней лечения не отмечено улучшение.Не использовать для приема внутрь.В период применения препарата следует избегать ультрафиолетового облучения.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора т.п.).

Условия хранения

В сухом месте