Инструкция по применению
Ци-Клим Аланин Таблетки 400 мг 60 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бета-аланин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 400 мг

Описание

Таблетки круглые, двояковыпуклые, белого или почти белого цвета. На поверхности таблеток допускается мраморность.

Действующее вещество

Бета-аланин

Состав

На одну таблетку: Действующее вещество: бета-аланин - 400 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 69,33 мг, крахмал картофельный - 26,55 мг, мальтодекстрин - 19,47 мг, кремния диоксид коллоидный - 11,00 мг, тальк - 11,00 мг, кроскармеллоза натрия - 8,25 мг, кальция стеарат - 4.40 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

"Приливы", обусловленные климактерическим периодом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь. По 1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличена до 3-х таблеток в день. Длительность лечения от 5-10 дней до исчезновения "приливов". При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения. В связи с тем, что привыкания к препарату не возникает, лечение может быть продлено на весь период вазомоторных клинических расстройств без ограничения его продолжительности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бета-аланину или любому из вспомогательных веществ препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не предназначен для применения в период беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь). Очень редко: преходящие парестезии, как правило, в конечностях.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы. В случае передозировки препарата проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Перед началом приема препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом. Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.